



636.089

Jón

Læfninga-Bók

um þá

helztu kvilla á Kvikfénaði,

samantekin

fyrir Íslendinga og lögud eptir þorsum þeirra

af

Jóni Gjaltnin,

Studios, Chirurg. et Medic.

Landsfólkasafn

Raupmannahöfn.

Prentuð í enni Þoppsku prentsmíðju.

~~~~~  
1857.



Öllum góðum Bændum  
á Íslandi

veri ritlingur þessi  
med virðingu og hjærleika  
f i l e i n k a d u r !

af

Rithöfundinum.







## Til Lesarans!

Þeir vita ómálga mein, segir ordtælid, og á það opt heima hjá stépnunum, því þó þær verði veifar, þá veit almenníngur flaldan hvað að þeim gengur, og deya þær þannig opt af létvægum Evilla, sökum vanfönnáttu eiganda, þeim til stórs skada. Að þetta opt stédur á Íslandi, er engin furða, og í þessu falli má segja um landsmenn mína, „að því er síðl að fátt er fénnt,“ þar enginn hefir ennþá orðid til að rita um Evilla á fénadi, jafnvel þótt allir viti, að Evikfénadur er hin mesta og bezta adstod Íslendinga.

Þegar eg var heima gafft mér opt tækifæri til að sjá hvörninn bændur mistu stépnur sínar opt af lítivægum Evilla, er þeir ekki þekktu eda vissu ráð amóti; þetta upphvatti mig til þess, að eg hér hefi varid tómstundum mínum til að gánga á Dýralæknara-skólann og Fynnamér Evikfénadar helztu sjúkðéma og hvörsu þeir yrðu læfnadir; Fom eg þá auga á hmoar læfningabækur, er Dýralæfnarar hasa samid í almenníngs þarsir, og hlotid hasa og verðskuldad almennt hrós; mér blöstradi þá hvað landsmenn mínir standa langt tilbaka fyrir þóðrum þjóðum í þessari grein, jafnvel þótt stépnurnar séu þeirra helzti nærlíngar-stofn; eg ímindadi mér að það bædi vær

vel gert og yrði góðfúslega virðt og meðtekið af Ís-  
lendugum, ef einhver ræðist í að semja hándhæga  
bók um þá algengustu sjúkdóma á sképnunum útá Ís-  
landi, og jafnframt kénndi heilnæm ráð þarámóti.  
Eg tók mér því fyrir höndur að skrifa bæfkingþenna  
eptir þeim nýstu og bestu Dýralæknisfaga bókum,  
eg gat fengið, og nefni eg hér þær helztu, er eg hefi  
haft mestanu stuðning af: nl. J. W. Kohlwe-  
slæfningabók fyrir bændur; Lectors G. C. Witts  
Sandsbók í Dýralæfnisfræðinni, og J. S. C. Diete-  
richs Dýralæfningabók. Þeirri fyrstu hefi eg víða,  
hvar því völd viðfomid, þvínær orðrétt fylgt, en  
Kapitulann um Sundaveikina hefi eg tekið úr þeirri  
síðustu. Kablinn um Sjárpestina hefir fóstad mig  
töluverðt ómað, því eg hefi, að minni hyggju, tilteint  
allt hvað þarum skrifað er; notaði eg í því skyni  
bæði Serdabók Landlæknis Bjarna sál. Pálsson-  
ar og annara, sémuleidis allt hvað eg sjálfur víssi  
og fann bæði í Veterinair Selskabets Skrifter og í  
skriflum til hins Fonunglega Rentukammers.

Vid sérhöggu sjúkdóm hefi eg gétid allra þeirra  
bestu medala, sem ráðlögð eru í tédum bókum, jafn-  
vel þótt eg viti að landsmenn mínir ei alltid hafi  
þau vid höndina, en hægter höfðjum sem vill að fá þau  
bæði hjá Apóthekaranum og Sjórdungslæknurunum,  
og væri ómíssandi fyrir bændur á Íslandi, sem hafa  
margar sképnur, að kaupa hin helztu af þeim og hafa í  
húsum sínum, allíka og bændur gjöra erlendis; þarhjá  
hefi eg, hvar mér þókti hæfa, gétid allra þeirra inn-  
lendu urta, er brúka má í stad hinna dýrari skjalda,

fengari medala, þegar bændur ei gétu fengid þau. Eg heft optastnær líka nefnt þau laínstu nýst urta-anna, gérði eg það til þessa, að læfnarar og prestar, af hvörjum margir eru grasastróðir, síður skyldu fara vilt á nýsnum þeirra.

Med því margir hafa á seinni tímum orðid til að rita fyrir Landsmenn mína, og útgífa bækur, og þó um þær megi segja líft og stáldid sagði forðum: „sumt var gaman, sumt var þarft, sumt vér ei umtölum,“ þá veit eg nú að nokkrum lönðum mínum másté muni þykja svo sem eg með bækling þessum beri í bakafullann læfinn; en þeim einum vil eg svara því, að af nytssömum bófum, sem ennþá eru óþéttar, er framar oflitid enn ofmiðid á Íslandi, og vonar mig að bækling þenna megi telja meðal nyttsamra bóka, es rétt er meðfarid.

Þegar eg í hausti fékk Bodsbréfin að heiman, þau er eg sendi út til Íslands í fyrra vor, þröngti eg að gétu gífud út bók þessa, þarad svo fáir höfðu þrifið sig fyrir heimi, og hefði bæði spæm esnaleyps og annrífis mátt láta þarvid lenda, es ekki sá góð frægi og lönðum sínum svo velviljadi Prestur Síra Þorgeir Gudmundsson hefði styrkt mig þartil með ráð og dád; hönum er það þannveg mestad þakka að bæklingur þessi fémur fyrir almennings sjónir. Hann upphvatti mig til að vid létum fösta meðfylgjandi eirmálverk, er sjónir tilbúning hinna helztu Dýralæfnara verkefara, er stýnsamir bændur vel gétu tilbúid, og svo brúfad sem eg heft sagt fyrir í bæklingi þessum; þetta hefir að vísu gjórt bæklinginn nokkud dýrari enn hann ella hefði orðid, en mér þótti þetta gjöra

## VIII

hann bædi nyttsamari og eigulegri, og vona eg að enginn viti mig þar fyrir.

Vegna annrísis hési eg opt mátt vera stuttordart enn eg annars mundi hafa viljad; og þykist eg því vita að orðfæri og stílmáti eigi er svo vandad, sem vera mætti, hefði tíminn verið nógur, en eg vona svo góða til landa minna, að þeir góðfúslega affaki mig og taki viljann fyrir verfid. Að endingu óska eg, að mínir heidrudu landar mættu hafa þá möguleg not af bæklungi þessum, og að þeir gætu, eptir hans ávisun, hjálpad flépnunum sínum, þegar sjúkar verða, sér til hagnadar og hamingju, þykist eg þá njóta þeirra fjærkomnustu launa og stærstu gleði fyrir ómað mitt.

Kaupmannahöfn, 1ta Aprílís 1837.

**Jón Bjaltalin.**



## S n n i h a l d.

### 1 Kapítuli.

Blads

Um kynferði hesta og eldi þeirra. . . . 1—8.

### 2 Kapítuli.

Um hestanna útvortis sjúkdóma, þeirra einkenni,  
upptöf og lækningarmáta.

|       |                                                              |        |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|
| § 1.  | Um meinsemdir í munninum. . . . .                            | 9—11.  |
| § 2.  | Um Augnaveiki . . . . .                                      | 11—13. |
| § 3.  | Um Kirtlabólgu undir hjálfunum . . . . .                     | 13—16. |
| § 4.  | Um Hálsmeini hesta . . . . .                                 | 16—17. |
| § 5.  | Um Mjó-sár á hálsinum . . . . .                              | 17—18. |
| § 6.  | Um Meidfli . . . . .                                         | 18—20. |
| § 7.  | Um Bógmagnleysi . . . . .                                    | 20—22. |
| § 8.  | Um Gleidur undan gjordum . . . . .                           | 22—23. |
| § 9.  | Um Káli framand brágunni . . . . .                           | 23.    |
| § 10. | Um Hnévap . . . . .                                          | 23—24. |
| § 11. | Um Einahnút í framfótunum . . . . .                          | 24—25. |
| § 12. | Ef Kjútlusidurinn fer úr líði . . . . .                      | 25—26. |
| § 13. | Um Kvaphnútt á bógnum . . . . .                              | 26—28. |
| § 14. | Um Káli á hófflégginu . . . . .                              | 28.    |
| § 15. | Um Bólgu í Krónlidnum . . . . .                              | 28—29. |
| § 16. | Um Hófsætu . . . . .                                         | 29.    |
| § 17. | Ef hestar slíga sig . . . . .                                | 29—30. |
| § 18. | Um Kjálumeidfli . . . . .                                    | 30—31. |
| § 19. | Um nagla og annað, sem stungist getur uppi hófinni . . . . . | 32—33. |
| § 20. | Um Hófsæri . . . . .                                         | 33.    |

# X

|                                              | Blads. |
|----------------------------------------------|--------|
| § 21. Ad járna hesta . . . . .               | 33—34. |
| § 22. Um Bólgu nedaná kvíðnum . . . . .      | 34—35. |
| § 23. Nabla-kvíðslit á foleldum . . . . .    | 35.    |
| § 24. um Mar á hestum . . . . .              | 35.    |
| § 25. Um Stríðleika í tærum hesta . . . . .  | 35—36. |
| § 26. Um Hnútt á Konungsnefs-íðnum . . . . . | 37.    |
| § 27. Um Urti á Konungsnefsinu . . . . .     | 37—38. |
| § 28. Um Bólgu í opturfótunum . . . . .      | 38.    |
| § 29. Um Blífu í fjúkúliðnum . . . . .       | 38.    |
| § 30. Um Stertbrot og Taglveiki . . . . .    | 39—40. |
| § 31. Um Káli . . . . .                      | 40.    |
| § 32. Um Kláða á hestum . . . . .            | 40—42. |
| § 33. Um Dffa-kláða . . . . .                | 42.    |
| § 34. Um Lúsa-veiki . . . . .                | 42.    |
| § 35. Um Hringorma . . . . .                 | 43.    |
| § 36. Um Sár . . . . .                       | 43—34. |
| § 37. Um Weinbrot . . . . .                  | 45.    |

## 3 Kapítuli.

Um innvortis sjúkdóma á hestum, þeirra einkenni,  
upptek og lækningarmáta.

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| § 1. Um Grofsasótt . . . . .                   | 45—47. |
| § 2. Um Þvagteppu . . . . .                    | 47.    |
| § 3. Um Klums . . . . .                        | 47—49. |
| § 4. Um Kolduveiki . . . . .                   | 49—51. |
| § 5. Um Bólgu í heilanum . . . . .             | 51.    |
| § 5. Um Bólgu í língunum . . . . .             | 51—52. |
| § 7. Um Nýrnabólgu eða Nýrna-ísgjerd . . . . . | 52.    |
| § 7. Um Harðsperru . . . . .                   | 52—53. |
| § 9. Um Heysótt . . . . .                      | 53—54. |
| § 10. Um Nálg . . . . .                        | 54—55. |
| § 11. Um Blúðhlaup . . . . .                   | 55.    |
| § 12. Um Hófuðsótt . . . . .                   | 55—56. |

## 4 Kapítuli.

Um Kyrt og Nautpening . . . . . 57—59.

### 5 Kapítuli.

Um útvortis sjúkdóma á Nautpeningi, þeirra einkenni  
tilefni og lækningarmáta.

|       |                                                      |        |
|-------|------------------------------------------------------|--------|
| § 1.  | Um Tönnurnar . . . . .                               | 59—60. |
| § 2.  | um Knéboap . . . . .                                 | 60.    |
| § 3.  | Um nagla og annað, sem stungist getur uppí fæturnar. | 60.    |
| § 4.  | Ef úr líði fer . . . . .                             | 60.    |
| § 5.  | Um sár á Nautpeningi . . . . .                       | 61.    |
| § 6.  | Um Kpli . . . . .                                    | 61.    |
| § 7.  | Um Bólgu í júvrinu. . . . .                          | 62—63. |
| § 8.  | Um Sprúngur í júvrinu og spenunum . . . . .          | 63.    |
| § 9.  | Um blóðuga mjólk . . . . .                           | 63.    |
| § 10. | Um Kláda . . . . .                                   | 63—65. |
| § 11. | Um Lúð á Nautpeningi . . . . .                       | 65.    |
| § 12. | Ef Kyr verða géldar . . . . .                        | 65—66. |

### 6 Kapítuli.

Um innvortis sjúkdóma á Nautpeningi, þeirra einkenni  
tilefni og lækningarmáta.

|       |                                       |        |
|-------|---------------------------------------|--------|
| § 1.  | Um Búkhlaup . . . . .                 | 67—69. |
| § 2.  | Um Harðlífi og Iðragift . . . . .     | 68—69. |
| § 3.  | Um Upphembu . . . . .                 | 69—71. |
| § 4.  | Um Harðsperru . . . . .               | 70—72. |
| § 5.  | Um Lúngnabólgu . . . . .              | 73.    |
| § 6.  | Um Gulu . . . . .                     | 72—74. |
| § 7.  | Um Fajörðarbólgu í heilanum . . . . . | 73—75. |
| § 8.  | Um Nýrnabólgu . . . . .               | 76.    |
| § 9.  | Ef Nautpeningur etur eitru. . . . .   | 75—76. |
| § 10. | Um Drma . . . . .                     | 78.    |
| § 11. | Um Lúngnaveiki . . . . .              | 76—78. |
| § 12. | Um Miltis bráðbauda . . . . .         | 79—81. |

### 7 Kapítuli.

Um val, uppeldi og meðferð á Saudfénadi 82—86.

## 8 Kapítuli.

## Um útvortis sjúkdóma á Sautfénadi.

|   |                                  |        |
|---|----------------------------------|--------|
| § | 1. Um Lóubít . . . . .           | 86—87. |
| § | 2. Um Bólgu í járvinu . . . . .  | 87—89. |
| § | 3. Um Kláða . . . . .            | 89—90. |
| § | 4. Um Lús á Sautfénadi . . . . . | 90.    |
| § | 5. Um Beinbrot . . . . .         | 90—91. |

## 9 Kapítuli.

## Um innvortis sjúkdóma á Sautfénadi.

|   |                                                                                                                                                                                                   |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § | 1. Um Hofubótt . . . . .                                                                                                                                                                          | 91—92.  |
| § | 2. Um Bláðlaup og Blóðbótt . . . . .                                                                                                                                                              | 92.     |
| § | 3. Um Drima . . . . .                                                                                                                                                                             | 92—93.  |
| § | 4. Um Fgjörðarbólgu í heilanum . . . . .                                                                                                                                                          | 93.     |
| § | 5. Um Bráðdauda á Lombum . . . . .                                                                                                                                                                | 93—95.  |
| § | 6. Um Lúgnaveifi. . . . .                                                                                                                                                                         | 95.     |
| § | 7. Um Bráðdauda á Sautfé, hvartil heyr þessar<br>5 tegundir: a) Fjörubráðdaudi. b) Miltis-bráð-<br>daudi. c) Lúgnabólga. e) Upphemba eða Winda-<br>veifi. e) Fjárbóla eða spansta pesin . . . . . | 96—111. |

## 10 Kapítuli. Um Hundaveifi.

|   |                                          |          |
|---|------------------------------------------|----------|
| § | 1. Fangaúgur . . . . .                   | 111.     |
| § | 2. Ef Hundar fá bein í hálsinn . . . . . | 112—113. |
| § | 3. Um Sár og Bruna . . . . .             | 113.     |
| § | 4. Um Beinbrot . . . . .                 | 113—114. |
| § | 5. Um Hundafataður . . . . .             | 115—116. |
| § | 6. Um Kláða . . . . .                    | 117—118. |
| § | 7. Um Wði á hundum . . . . .             | 118—119. |

## Bibbatir.

|    |                                                 |          |
|----|-------------------------------------------------|----------|
| 1. | Um Merki á lífæðinni hjá Kvíkfénadi . . . . .   | 120—121. |
| 2. | Um Blóðtokur . . . . .                          | 121—122. |
| 3. | Um hvornig Baunir og Hánka á að setja . . . . . | 122—125. |
| 4. | Um hvornig Blóðrás á að stöðvast . . . . .      | 125—126. |
| 5. | Um Lambasgélðingu . . . . .                     | 126—127. |





## 1 Kapítuli.

Um kynferdi Hesta, og eldi þeirra.

Hesturinn er einhver hin þarfasta sképna fyrir manninn, en er og svo mörgum sjúkdómum undirorpinn; þessvegna skal hér talad fyrst um þá sjúkdóma, sem eru algengastir á hestum á Íslandi.

---

Það er meðal Dýralæfnara almennt vidtekið, að mikid sé undir því komid að vanda kynferdi hesta, og að bæði færleikar og gradhestar séu sem best valdir til þess; en þótt nú allir viti hvað búi er við að koma á Íslandi, hvar Stóð gengur, svo hópum skiptir, uppá afréttum sjálfala það mesta af sumrinu, þá skal hér samt stuttlega dregid á þau helztu einkenni á færleikum og gradhestum, sem álitast mega góð til undar:lds. Gradhesturinn má ei hafa stærra höfud enn vel samsvari kroppnum; eyrun eiga að vera smá og ekki standa oflángt hvort frá öðru; augun stór, framstandandi og þó lytalaus; hálsinn lángur, eigi þykur um of upp við mackann, því þá ber hesturinn skjaldan höfudid vel; hálsinn má heldur ekki vera boginn nidurávid, (er almennt kallast Hjartarháls) hvað ed gjoirir hestinn óalitligann; brjóstid skal vera

breidt og framfæturnir uppvið bógjinn breiðir og sterklegir, því séu þeir mjóir og veiklulegir, er hesturinn optast beygja; Enéð á að vera breidt að framan, fótleggurinn og finin, sem þartil er fest, breið til beggja hlida; hófsféggslids-beinid svo stutt sem verður, og skyldi það vera í lengra lagi, þá má það eigi bogna þegar hesturinn gengur, því það er vottur þess, að beinid er veikt; hófurinn á að vera sléttur bæði að framan og til hliðanna, án sprungna; nedri hluti hófsins á að vera holur en ekki slatur; fótleggirnir eiga að vera beinir, það er að fjilja: að jafn langt skal vera á milli fótanna nedantil sem uppvið bógjinn; heldur ekki mega fæturnir standa á flá út eða innad, heldur öldungis réttir; hryggurinn á að vera beinn en ekki bóginn innávið; kroppurinn frá bögnum sívalur og bógarnir ekki alltof háir; lendin ável, flöt, en ekki framstandandi; lærin breið og sterk, og konungsnefs lidamótin sterk; frá konungsnefinu allt niður til hófsins eiga apturfæturnir að vera eins og framfæturnir, þeir mega ekki heldur standa oflángt eða stutt hvor frá öðrum nedantil; merki madur til hnúta bakvið konungsnefid eða á því sjálfu (Spat og Galle) edur og nedantil við hófslibinn, þá er það slæmt merki; báðir kólfarnir eiga að vera audsjáanlegir á góðum gradhesti. Skjaldbgjæft er það, að allir þessir eiginlegleikar finnast hjá einum hesti, en því fleiri sem hesturinn hefir af þeim, þess betri er hann.

Þérumbil somu kénnumerki eru á góðum færleikum; en það er almenn meining Dýralæfnara, að folöldund-an færleikum innan þriggja ára verði aldrei eins góðir

og sterkir hestir sem undan eldri. Gylbir færleikar, sem  
 hafðar eru mjög í brúfun, verða ætíð að fódrað vel,  
 að þær gæti bæði verið duglegar til brúfunar og lifa fæðt  
 folöld sín. Merki, sem gæfa til kynna að færleikur sé  
 með folalði, eru eigi ætíð áreiðanleg í þeim fyrstu 4  
 mánuðum, en eftir þann tíma gétur maður gengið úr  
 skugga um það á þenna hátt: maður standi við hlið-  
 ina á færleikum, þegar maður gæfur henni að drekka,  
 og leggji svo hendina flata á kvíðinn rétt fyrir-  
 framan júvrið, mun þá maður hæglega gæta merkt hrær-  
 ingu þá, sem folalðið gerir með framfótunum. Gott  
 er, gæti laghendtur maður verið við, þegar færleikur  
 á að kasta, til þess, ef með þarf, að gæta hjálpad bæði  
 færleiknum sem folalðinu. Veri það við, að færleikur  
 fæði í hesthúsi, gétur það stéð, að hún vegna fæðingar-  
 hridanna setji bakhlutann svo fast uppvið vegginn, að  
 það bæði stæði folalðið og hindri fæðinguna, þá er það  
 naudsýnlegt að færleikurinn færist burt frá veggnum, svo að  
 hún gæti kastad. Strax sem folalðið er kastad, eiga  
 himnur þær að sprengjast, sem eru utanum það; síðan  
 skal binda fyrir naslastrenginn og stéra hann í sundur  
 2gja fingra breidd frá kvíðnum; þetta er samt ekki  
 naudsýnlegt, þar hann optast fer í sundur, hvar bandið  
 er um hann bundið, og að folalðið deyi af blóðmísir  
 þarfmadur ekki að óttast fyrir. Verði maður þess var,  
 að færleikur ætti bágt með að kasta, væri ráðlegt að  
 hafa hana heima við bæi um það leiti, svo sképnunni  
 yrði hjálpad; vissasta merki uppá að færleikar séu  
 komnir að föstum er það, að þær fá mjólf í júvrið.

Orsakir til að færleikar fasta offnemma eru síðvana-  
lega þessar: að þær annaðhvort hausti eða vor bíta  
frosið gras, eða hvar hrim hefir áfallið, ellegar að þær  
í rigningum og öldu vedri hafa svitnad og þaræptir  
orðið kaldt; það fyrra gétur maður fyrirbygggt með  
 því, að halda þeim inni á nóttum, og ekki sleppa þeim  
 út fyrirrenn hrimid er áfallið, og taka þær inn á kvöldin  
 áður hrim áfellur; og að þeim verði ekki ofkaldt ept-  
 irað þær snögglega hafa svitnad, má fyrirbyggjast með  
 því að leggja brekán yfir þær \*). Önnur tilfelli, sem  
 gæta orsakad að færleikar fasti offnemma, svo sem hogg,  
 flog, þar sem hestar ganga úti í hogum, er ómögulegt  
 við að gjöra. Í hesthúsum ætti maður þar á móti að láta  
 færleika með fylki standa sér, og hlífa þeim sem mest  
 verður við mikilli áreynslu; og skyldi færleikur fasta á  
 vetrardag, og folaldið eigi að lifa, er best að færleikur-  
 inn sé útaf fyrir sig, bæði áður enn hún fastar, sem  
 og eptir það, allt þángadtil að bæði gæti gengið úti.

Þegar svo ber við, að færleikur ekki gétur án hjálpar  
 fastad, þá verður maður strax að vera nærstaddur, því  
 annars ofþjáfast færleikurinn af fæðingarhridunum og  
 fæðingin verður þá ómöguleg. Þegar báðir fæturnir  
 eru fæddir og folaldið ekki fylgir með við fæðingarhrid-  
 iernar, verður maður að hjálpa náttúrunni með því að  
 toga í báðar fæturnar, og þannig útdraga folaldið;

---

\*) Þó mun þessu bágt að viðkoma á Íslandi, en þessa  
 er hér því gætið, að þetta er síðvenja í öðrum löndum,  
 og gæti allvel á morgum stöðum brúfast á Íslandi.

hjálp þetta ekki, smóðkar maður upp erminni á hægri handlegg, smyr handlegginn með oliu eða lyfi, og færir nú hendina lángs með þeim úthángandi fótum inni móðurskeidina, og ransakar hvort hofud folaldsins ekki sé beygt aptur á við; sé það nú svo, færir hendin lengra inn, svo maður nái utanum munn folaldsins, og gæti svo beygt hofudid fram á við; og strax sem nú fæðingarhribirnar láta sig í ljósi, togar maður nú jafnframt í fætur og hofud, hvarvið folaldbid þá hæglega fæðist. Adgætandi er við verk þetta, að maður áður hafi stöð neglur sínar vandlega, svo þær hverki stöð fósturid né fæðingarvegina. Sé nú einungis annar fótur folaldsins fæddur, en hinn stöð innans fyrir og hindri fæðinguna, verður maður, sem fyrir er sagt, að færa hendina inni móðurskeidina, ná fætinum út það fljóta, og plagar fósturid þá að fylgja strax á eftir. Beri nú svo við að báðir fætur folaldsins ásamt hofdinu liggi innans fyrir þá útvortis fæðingarlimi, má þá fótur fyrst út dragast, sem best verður aðkomist, þareftir hinn fóturinn og hofudid, og að lokum sjálft folaldbid. Orðugri er fæðingin, þegar folaldbid liggur rángfælis, svo að apturfæturnar ber að, en hofud folaldsins veit framá við að brjósti færlisins; vilji þannig til, verður að binda sterkum bandi ofantil við konungsnafid á apturfæti fóstursins, og þannveg toga fótinn fram, sem ómegulegt er með hendinni eintómri; sama aðferð er við hinn fótinn, og nú útdregst folaldbid með því að toga í báðar fæturnar; fæðing þessi er mikil hærð, en þó er þetta reynandi heldurenn að bæði deyi hjálparlaus. Það ber oft við, að

eptir þvílíka fæðingu kemur bólga í móðurskeidina, og má þá aðfara þannig: bólgan auglýsir sig í munna móðurskeidarinnar, og strax sem vart verður við hana, skal færleiknum tafast blóð á háls-æðinni, sem svari einum potti, og þaræðfan badist móðurskeidin með fólðu vatni; vari bólgan altæðinu, verður maður að gefa færleiknum 2 lóð af hreinsubum saltþétri, uppleystum í einum potti vatns; þaræptir heldur maður áfram að bada móðurskeidina, þar til bólgan hverfur.

Éf færleikurinn mogur, verður hún að komast í góðann grasgáng eða hafa nægilegt fóður, svo hún geti mjólkad vel og fæðt fólald sitt. Eðfi er gott að brúka færleika milkið þann fyrsta hálsa mánuð eptir að þær hafa fæstad, því bæði veikir það þær og fólalðið, ef til vill.

Éf þú getur að færleikar séu svo illar, eður og að þær titli, svo fólalðið ei fái að sjúga þær; skal þá taka hefub fólaldsins og halda því fóstu, en annar maður haldi upp framfæti færleiksins á þeirri hlið, sem fólalðið á að sjúga, svo færleikurinn ei geti flegið fólalðið; hjálpi þetta eðfi, skal binda snæri um flipa færleiksins og reyra fast á meðan fólalðið sigur; þetta itrefast fleirum sinnum, þar til færleikurinn tekur við fólaldinu. Hafi færleikurinn mjög litla mjólk, þá verður að láta hana standa á góðu fódurlendi, eður og gefa henni inni, ef færi er til, en aðgætandi er þá, að hún hafi nóg að drekka. Svo framt því verður viðkomid, er bezt að láta fólalðið ganga undir móðirinni þá fyrstu 6 mánuði eptir að það er fæstad,


þó má taka það frá færleiknum eftir 5 mánuði, einkum sé það síðla fastad. Mjög ridur á að folöld séu vel alin hinn fyrsta vetur, því forsómist það, fá þau aldrei eins góða frapta, sem annars væri audid, og verda optast hengjur.

Alstadar þar, hvar járna þarf hesta, sem víðast er síður á Íslandi, ráða Hestalæknarar til, að venja folöld þartil strax frá unga aldri; gjörift það með því móti, að maður hvörn 3ja mánuð heldur fótum þeirra upp á vixl, og skér af hófunum, hvar þeir eru oflángir; aðferð þessi er nytsem í tvöföldu tilliti, því bæði venjast folöldin á því til að verda járnud, og lífa kémur maður með þessu í veginn fyrir að hestar verði skakkhæfdir, sem alltid er forsómun eigandans að kenna. Vilji folalldid ei standa, þegar fæti þess er lypt upp, þá verður að binda snæri um skolt þess.

Hesthús folalda eiga að vera heit, en þó ekki rafafull; þetta fyrirbyggist best við að hleypa folöldum út, þegar gott er, og moka hesthúsid iduglega. Maudsýnlegt er að hafa litinn glugga á hesthúsinu, því dymm hús eru öllum sképnum, og einkanlega þeim ungu, mjög skadvænleg. Gott er að kemma folöld iduglega, hvar þess er kostur. Aðgættandi er líka, að maður ekki brúki trippi offnemma, því aldrei ætti maður að brúka unga hesta til sterkrar áreynslu, fyrrenn þeir eru 4ra vetra, þess endangar betri verda þeir.

Góður hesta ætti að vera gott, einkum reidhesta; mjög brennt og miglad hey er öllum hestum mjög óhollt, en þó einkum folöldum; sama er og að segja um myra-

gras, sem offnemma er flegid, því foleldin fá gjarnan sótt þaraf og þrífast illa. Ugæta vel má ala hesta á hofurum, því bæði verða þeir þaraf fraptbetri og lífa lífsadri enn af einsemlu heyi. Bygg má lífa gæfa úngum hestum og gömlum, Rúgur er þarámóti óhollur þeim úngu. Ugætandi er, að hey, sem eldishestum er ætlad, ætti aldrei að slá offseint, því þarvið verður það fraptminna; best er það hey fyrir þá, sem flegid er á þurrlendum fjallslæum edur og vallendis bekkum. Gæfi er hægt að ákvarða, hvað mikid fódur hesti skal gæfa, því það er mikid komid undir stærð og brúkun hans; en ætíð ætti maður að sjá til að gæfa hestum góðum tíma áður enn þeir væru brúkaðir, því óhollar eru þeim fastar ágirdingar, er þeir hafa nýlega etid, það gétur þorsafad, að þeir ei þrífist af fódinu, en verði megrí og fraptaminni. Ginka gott er að busta reidhesta iduglega edur og nú á þá með heyi, það orfar þá og viðheldur heilsu þeirra; somuleidis er það mjög naudsynlegt að halda þeim vel hreinum. Þar sem mögulegt er, ættu hestar ætíð að ganga á fjalllendi, vita þeir og gjarnan fjálfir, þar sem svo ástendur, að velja sér það, og reynslan hefir kénnt, að gras það, sem vex á fjalllendi, enda þó það sé smærra, er bæði meira nærandi og lífa hestum hollara, enn það, sem vex á láglendi og í mýrum.





## 2 Kapítuli.

Um Hestanna útvortis sjúkdóma, þeirra ein-  
fenni, upptöf og lækningar-máta.

### § 1.

Um meinsemdir í munninum.

Framantil og innantil á efri flipa (Overlæbe) koma stundum smá vatnsblóðrur; þessar mega stífast burtu með beittum knífi, þareptir nyr madur salti í sárid, og læknað þær þá af sjálfu sér.

Þegar fololdin flípta tonnnum (fá nýar tonnur) ber það stundum við, að sú lausa tonn ekki vill falla burt, þaraf orsakast það, að sú nýja tonn verður stöfk, en þetta er hægt að hindra með því strax að brjóta þá gömlu tonn burt.

Þegar trippin eru 2gja eður 3gja ára gomul, ver stundum efri flipinn framysfir tonnurnar, sem hindrar þau frá að bíta; þetta læknað með því að stífa 2 sturdi í gegnum flipann innanfrá útad; sturdina lætur madur blæða svo mikil sem þeir vilja, og smyr svo sárin með hunáangi, sem blandad sé með edifi, gróa þau þá bráðum.

Dpt ber það við, að hestar fá sár í munninn undan beizlum, og er þá einfalt gott að smyrja sárin með edifi og hunáangi nokkrum sinnum daglega. Stundum sérst tunga hestsins af beizlinu; sár það má þá svo með seltu vatni, og þareptir smyrja með edifi og hunáangi.

Þegar svo ber við, að munnvatnid iduglega rennur útúr hestinum, og hesturinn þarhjá er dauður, hengir hofubid niður, vill ekki bíta, blóðugir blettir sjást á

túngunni og uppi í gómnum, þá kallast sjúkdómur þessi *Túngubloðruð* (Troðstefhyge). Sjúkdómur þessi læknast þannig: madur tekur sívala spítu, 1ar álnar lánga, og ádigurð við þumalsfingur, klífur hana í annann enda í þros (álíft sem gaslof), festir þarí finar léreptírfur, og bindur svo fast um endann að eigi losni; þareptir tekur madur einn matspón af hunáangi, 1 pela af oledifi og handfylli af salti, og hrærir þetta saman; nú dýfir madur léreptíriunum í þetta sambland, og smyr því á góm og túngu hestsins 3svarsinnum daglega, hvarvid hesturinn frlast við kvilla þenna.

Stundum ber það við, að hestar allt í einu hætta að jeta, kemur það af því, að kvistur sezt í millum tannanna þvers yfir túnguna, svo hesturinn á bágt með að renna nidur; á þessu er hægt að ráða bót þannig: madur leggur þykkva spítu milli tannanna, og ransafar svo munninn, og tekur kvistinn eða hvað annað, er vera kann millum tannanna, út með fingrunum.

Í útlandum, hvar hestum ástundum er géfð kál og kartoflur, ber það oft við, að það situr fast í vælindinu, svo hesturinn getur eigi kyngt því; hesturinn teigir þá hefudid framávid og vill reyna til að hósta; augun standa stíf og lifædin slær ngeg ódt, utaná hálsinum finnst líka sem hnútur. Hafi madur nú spansreyrstaf eða spítu úr gyrdi eða stídi, sívala og 4 feta lánga og hérum fingurs þykkva, þá skal madur vefja þunnu lérepti um annann enda hennar, smyrja þenna enda með lífi eða oliu, láta nú adra spítu milli tanna hestsins, og með ádurteðum staf eða spítu reyna til að hta jardeplinu

eda kálleggnum nidur í maga hestsins; en meðan á því stendur, má annar maður halda höfði hestsins svoleidis, að það standi í beinni línu með hálsinum. Hjálpi þetta ekki, plaga Hestalæknarar að gæra langann stund vinstra megin á hálsinum, hvar vælindid liggur, opna nú vælindid og úttaka bitann, og sauma það svo saman aftur, loka nú sárinu, sem þeir bada nokkrum sinnum daglega með feldu vatni, og fódra svo hestinn með storum hestrum, þartil sárid er gróid. Aðgæta er við þetta, að maður eigi fundurferi lif-eda blóð-æðina, sem liggur í hálsinum.

## § 2.

## Um Augna-veifi.

Beri svo við að annað eda bæði augun bólgni, hesturinn sé mjög voteygður og halði auganu aftur, og augað sé venju framar raudt, þá er þetta merki til augna-bólgu; strax skal þá hestinum blóð taka á háls-æðinni og skal blæða rúmann pott. Þið veifa auga má nú bada með feldu vatni, edur og daglega smyrja það með Blíhvítusálve með Kamfóru (unguentum album Camphoratum) vel þrýtt yfir augnalofid. Sé nú augað, þegar bólgan er horfin, íklárt, þarf eigi meiri viðgjörðar við; komi þarómóti himna yfir það, sem ekki hverfi af sjálfu sér eptir 8 daga, þá er venja að hánka hestinn á kinninni nedantil við augað, edur og taka 1 quintin af Spanksflugnapúlveri og 1 lóð af svínaseiti, gjöra þaraf smyrslí og smyrja þessu á og umkring hið veifa auga. Nokkrir brúka hveiti með 3 lóðum af

Glaubersalti. (Sal mirabile glauveri), hræra það út í vatni og gefa hestinum 2 svar sinnum dagliga. Hafi auga hestsins meiddst af útvortis tilfellum, er nóg að bada það með feldu vatni og taka hestinum blóð, án þess að brúka noður smyrslí. Þái hesturinn fleirum sinnum illt í augun, og það komi af innvortis orsökum, þá er það slæmt merki, því þá plagar að koma Starblindu (Catharacta) að lokunum. Komi og fari augna-veiki á hesti hvað eptir annað, kallast það Mánaðarblindni (Maanedes-Blindhed); ekki hafa duglegustu læknarar ennþá gétad fundid ráð við þessum kvilla.

Til eru og svo augna sjúkdómar, sem koma af veiklu í augunum; eru þeir tíðastir á hestum þeim, sem hafa gengid á raklendi í vötvíðri. Sjúkdómsins kennimerki eru þessi: augað er bólgið og flýtur í vatni; hornhimnan \*) er optast gagnsær, þó eru stundum stj á henni; þó hornhimnan sé gagnsær, þá er þó opt vatnið, sem liggur í fremri augnakarminum grænlitad og grefti blandad; sé stj á hornhimnunni, er ómögulegt að sjá innvortis ástandid í auganu, fyrrenn stjid er horfid. Þegar þannveg er ástadit, má augað opt bada með eptirfylgjandi meðali: madur taki tvær handfyllir af Kamomillu-blómstrum (flores chamomillæ vulgaris), þará helli madur 1½ potti af sjóðandi vatni, og helli svo vatninu frá, þegar það hefir stadið 1 fjórða part

---

\*) Þannig nefnist sú svartu himna, er liggur fyrir sjáaldrinu.

Fluckustundar; í vatn þetta, sem er frásið, lætur maður 2 quintin af hvítu Vicríli (*vitriolum album*). Innvortis brúfast dýpt af Hvannarót (*radix angelicæ*) Gentianrót (*radix gentianæ*), og Wellandðurt (*radix valerianæ officinalis*), 12 lóð af hverri; af þessu púlveri tekur maður 2 lóð og blandar þeim 3svar sinnum dagliga í heyr hestisins. Eika er gott að brúka 1 pott af Rósfavatni með 1 lóði af *Opiumsdropum* til að bada angad með \*). Keyrnslan hefir kénnt, að betra er með pennafjedur að smyrja áminnst Blyfsalve með Kamfóru inni auguð; aðferdin er þessi: með vinstri handar þumal- og vísi-fingri aðfílur maður augnalofin á því veika auga, tekur nú litid eitt af smyrslum, sem svari einni baunar stærð, lætur það á pennafjedrina, og með henni inni augað, þareptir apturlyfjast augnalofin og pennafjedurinn tekst út.

### § 3.

#### Um Kirtlabólgu undir Fjálkanum.

Þá Kirtlabólgu þrúta kirtlarnir undir Fjálkanum, verða þar opt úr Fjöli, og skal þá þannig aðfara: strax sem vart verður við bólgu undir Fjálkanum, á bólgan daglega að smyrjast með gæsarfeiti, eða vanti hana, þá með svidaflóti \*\*), lappi af lambsfleinni sé nú bundinn

\*) Rp. *Aqvæ rosarum* ℞. *Tincturæ opii simplicis* ℥; d. s. *Ugnavatn*.

\*\*) Hafi maður hverki gæsarfeiti eða svidaflot, má vel brúka 4 lóð *Raubæroliu* og 4 lóð *Althea* smyrslu, (*ungventum altheæ*), og blanda vel saman.

yfir bólguna, og strax sem merkist til lgjordar er naudsýn ad stínga á khlínu med oddhvessum knífi; er khlid stórt, má gatid vera svo stórt, ad rúm sé fyrir 2 fingrum; sé það litid, þá þarf gatid eigi ad vera stærri enn sem svari 1 fingurs breidd, og má gatid ekki lokast fyrr enn khlid er útgrasid; en adgætandi er, ad áðurenn stúngid er á khlínu, eiga öll hár umhverfis það ad burtrafast; þaræptir heldur maður áfram med ad smyrja khlid med gæsarfeiti eða svidafloti, þartil það er gróid. Stundum koma fleiri khlí hvört eptir annað, og er adferdin öll hin sama. Khlí þessi koma ekki einasta bakvið kjálkann, heldur ogsvo í hálsinum, og eiga þau einnig ad smyrjast med gæsarfeiti eða svidafloti. Stundum lida munnvatns kirtlarnir med, er grefturinn snertir þá; beri svo við, rennur vatn útaf sárinu; verði maður þessa var, þá tekur maður upptáinn tjeruhamp, vætir hann í samblandi af 2 lóðum af Alóe-dropum (essentia aloes) og 2 quintinum Terebintinoliu, og stíngur svo hampinum inni sárid svo langt sem megulegt er.

Kirtlabólgur þessar géta og komid á adra parta líkamans, en adferdin er hin sama, nesnilega: ad stínga á khlínu, sjá til ad grefturinn gæti flotid út, ad gatid eigi grói offljótt saman, og sárid daglega hreinsist af greftinum\*).

---

\*) Það undrar víst margi ad smyrslí og plástrar ekki eru hér nesndir sem góð meðöl við khlá-meinum, en margir Dýralæknarar, þar á meðal sá nasnkendi Rohlfes álitur þá ekki naudsýnlega, og gjöra opt meiri flæða enn gagn-

Hafi hestar kirtlaveiki, verður að varna þeim við kulda, og eigi gefa þeim iskaldt vatn á vetrum, ef því verður mögulega viðkomid; og þegar þeir í sjúkdómnum géta jetid, má engin innvortis meðol gefa þeim, því náttúran friar þá frá frumefni kirtlanna með kylunum.

Skyldu kirtlabólgur á bakvið eyrun eda undir kjálkanum verða svo stórar, að andardráttur hestins þarvið hindradist, þá er naudsýnlegt að taka hestinum blóð, sem svari 1 potti, samt flyta fyrir að kylid grafi út, með því að leggja á það volgann hafragraut með steyttum lauk, og strax slinga á því, þegar maður merkir að groftur er í því.

Skylði svo viðbera að kirtlakýli kæmu á hliðinni undir auganu, svo að munnvatnsgangarnir sundurgræfust af grestinum, þá þeckist þetta af því, að munnvatnid rennur sem hreint vatn útúr sárinu; sár þetta verður þá optast sem mjór gángur, og læfnast torveldliga, fyrr enn ef svo vill til að munnvatnsgangarnir stoppist, svo munnvatnid gæti ei runnid út; þetta gétur nú einúngis stæð með því að brenna þá með glóandi járn; aðferðin er þá þessi: maður tekur sivalt járn álíka digurt og pipulegg, gjörir það glóandi, en leitar þó áður fyrir sér með kánnanum\*), hvornin sárid liggi og hvað djúpt það sé, nú færist það glóandi járn með smá snúnigum hægt og hægt niður að botni sársins, og þetta ítrekast

---

Náttúran læknar öll sár, þegar grofturinn gétur runnid út, og sárin haldaft hrein,

\*) Þannig kallast mjór stíll, tilbúinn úr silfri, járn eða blý, sem læknarar brúka til að kanna sár með.

noðrum sinnum; munnsvatnsgangarnir lofast nú við þetta, munnvatnið gétur ei flotið út og sáríð læknast fyrst að innanverðu; gott er, þegar maður brennur, að gjöra ytri munna sársins noðud stærri, svo það ei grói offljótt.

## § 4.

## Um Gálsmeið hesta (Strængel.).

Merki sjúkdómsins eru þessi: hesturinn vill eigi bíta og etur, ekki heyid, ef hann stendur inni; hann á líka bágt með að drekka, og vatnið sem hann reynir til að drekka rennur útum nasirnar; eyrun eru köld, höfuðið hængir niðurávið, og eptir því sem andardrátturinn verður þýngri, heyrir maður meira buldur, sem lifist hriglu niðuri hálsinum. Undir hálsinum nálægt barkafýlinu merkist til bólgu, og freysti maður bólguna verkjar hestinn; munnur hestsins er mjög heitur og tungan þur. Strax sem verður vart við þetta, skal hestinum blóð taka á hálsblóðæðinni, sem svari 1 potti, og gæfa hestinum þetta inn: tak  $\frac{1}{2}$  pund hunánga og hrær þari 8 lóð af hreinsudum steyttum Saltpéttri; fýlði þetta verða of blaut kássa, má blanda þari méli, svo það verði þykkra. Af þessu meðali smyr maður 4um sinnum daglega, sem svari 2 lóðum, með litlum spada á tungu hestsins. Bólguna undir hverfinni smyr maður 2svar sinnum daglega með þessari oliu: tak 8 lóð af Kamfóru og steyt i dupt, hell þar á smátt og smátt 8 lóðum af Vinolíu, og hrær svo i því, þartil Kamfóran er uppleyst i Vinolíunni; blanda þaræptir 4 lóðum af Salmiakspiritus (Spiri-



tus salis ammoniaci causticus) saman við þetta, og brúka svo þessi smyrslí sem áður er sagt, þartil hesturinn er ordinn albata \*). Varast verður, ef orðid gétur, að fúldi komi að hestinum, á meðan sjúkdómurinn varir; eigi má hann heldur drekka kalda vatn, heldur nymjólkur volgt vatni á meðan hann er sjúkur. Estrax sem hesturinn gétur farið að jeta, er best að gefa honum smátt-saxað hey eða hafra, ef til eru.

### § 5.

#### Um mjó-sár á hálsinum (Sistler).

Stámt bakvið eyrun koma stundum vínstra eða hægtra megin við nákkann laung og mjó sár; byrjar þetta með litilli bólgu á þeim stað, hvar farið seinna fémur, og á þá bólgan strax að smyrjast með salvi af 1 quintini Spanísflugupúlvers,  $\frac{1}{2}$  quintini Evphorbium gummi (gummi Evphorbium) og 2 lóðum af svidasloti; hérvið hverfur á stundum bólgan og orsökin til mjó-sáranna ásamt henni \*\*); ígrafi bólgan nú þrátt fyrir þetta út, verður með knífi að stækka gatid, þar sem grofturinn fémur út; sárið gjerist nidur á við, og verður það að vera svo stórt, að komast megi með fingri nidur að botni sársins;

\*) Séu þessi meðal ei við hendina, þá má brúka Kamferoliu, og Opodeldok, og vanti þetta, þá svidaslot eða hreint lýfi.

\*\*) Í stað þessa má líka brúka smyrslí af Vallhumli og nóu ósöltuðu bræddu smjóri, með litlu af Kamfórubrupti, um hvert seinna verður gátid.

þareptir tekur maður hor eða hamp og vætir í smyrslum þeim, sem nefnd eru í § 3, hvareptir hampur þessi látist niður í botn sárins; þetta verður að ítteka tvisvarsinnum daglega; þartil sárid grær, grofturinn sem setur sig á barma sárins verður vandlega að þvást í burtu.

Er mjó-sárid gamalt og grofturinn þunnur og lyftarflæmur, er að óttaft fyrir að sárid ná til hálsblidanna, edur másté og svo grafi í þeim; sé svo, skal maður fara inni sárid með laungum og sterkum blískanna, svo langt sem verður, halda henum í botni sárins útávid, og skera skurð nedantil á hálsinum, hvar finna má nedri enda af kannanum; þetta nýggjörða sár verður að ná til nedri enda mjó-sárins; inni þetta nýggjörða sár lætur maður nú hamp vættann í ádur umteldum smyrslum edur Teresbintínolíu; á sagdann hátt skal nú búa um sárid einusinni á hverjum degi, þágangtil það er gróid; en fari svo að nedri endi sárins grói offnuemma, verður þar að gæra nýann skurð. Við von er um að gæta læfnað þetta mjó-sár, sem annars er mjög hættulegt, þegar grofturinn er þvástur og ekki lyftarflæmur.

### § 6.

#### Um Meidöli.

Þegar meidöli koma undan reidtingum eða reidingi, verður að hafa þau í keldu vatni, edur og þvo þau með sápu og brennuvíni, hvarvid þau optast hverfa. Öpt kemur ofaná meidölin bladra, sem við ellina verður álíka og blautur svampur. Þetta verður nú að fringlótttri blöðru, sem maður með fingrunum gétur fundid að er

full af vatni, og sem má færa fram og aftur; á blöðru þessari má nú stinga annaðhvort með hestabildi eða landsetu, hvarvið hægt er að freysta vatnið út. Er blábrannur, má smyrja hana með smyrslum þeim, sem gétid er um í undangangandi §, um mjó-sárin, og láta svo sárid gróa af sjálfu sér. Komidandi undan reidthum, sem þekkt á því, að skinnid verður harðt, og lifist brendu leðri, skal maður daglega smyrja blettinn með svínasítu eða svidasloti; randirnar á daubablettinum eru þá vanar að losna, og má þá burtflippa þær; þannig heldur maður nú áfram, þar til bletturinn allur er burtuminn. Stundum ber það við, að groftur safnast undir blettinn og losar hann; fari svo, verður að stera burt allan hinn harða holdfúa blett; í sárid stráir maður nú öflu af brendum gemlum stóbótum, hreinsar það frá grestinum, og þá grær það bráðum. Sé holdfúa-bletturinn fastur allt um kring, má losa hann með feiti og burtstera, og strá svo í sárid ádurnesndri öflu af gemlum stóbótum.

Það ber oft við að sitan og kjotid undir skinninu, skadast af ádurteldum meidslum undan hnekkum og reidungi, grefur þá í ollu saman, og sinnst til grastrarins undir skinninu, þegan bólgan er horfin; það er nauðsynlegt strax að gera skurð til að uthleyppa grestinum, því annars gæti sked að grofturinn sigi niður á milli vöðvanna; skurður sá má gjörast að nedanverdu, svo grofturinn gæti frítt útrunnid; að því búnu skal maður með fingrinum þreifa inni sárid, til að vita hvort þar eru ei auða-holur, hverjar, ef finnast, strax eiga að uppskera, því annars mætti ské að vogurinn safnadi þar og æti meira um sig. Þegar

blóðid hættir að renna úr flurðinum, þá þvo sáríð vel umhverfis með volgu vatni, og nú leggur madur hamp yfir sáríð; næsta dag hreinsar madur blóðlifrarnar úr sárinu, og þekur það aptur með hampi, sem sé smurður með smyrslum af Spanßgrænu (pulveriseret Grønspaan) Mastirgúmmi, Bírak, Altheasafvi, Poppesafvi, Lauberjaolíu og Terebintín-olíu, 2 lóð af hverju; smyrslí þessi brúkast daglega, þar til sáríð er gróíð, en sáríð verður ætíð að haldaft hreint. \*) Glest sár á baki hesta gróa við smyrslí þessi, en þó má gæta þess, að madur ei þjappi hampinum svo ofan sáríð, að vogurinn ei nái að fljóta út; gæti madur, á meðan á græðslunni stendur, hlist hestinum við brúfun, gróa meidslin ennþá fljótara; verði ei hjá því komist að hesturinn sé brúkaður, þá má hvorki leggja reidsling né reidtyi á meidslin, því við það vesna þau. Sé nú sáríð orðið gamalt, og þar séu komin mörg djúp mjó-sár, sem hafa etíð um sig alít niður að brjósti og beinum, er ei annað ráðleggra, enn tóma hestinum til duglegs Hestalæknis, ef þess er þóttur.

## § 7.

## Um Bógmaguleysi (Bovlamhed).

Merki á stjúlðinum eru: þegar hesturinn er teiður áfram, snýr hann fætinum í hálfhring, og lyptir þeim fæti

---

\*) Bændur, sem bágst eiga með að fá smyrslí þessi, gæta búið sér til önnur álíka góð af smástorinni Blóðrót, sem flóðist í nýu óflettubú smjör; þegar smjöríð er sláð frá, má blanda því dálitlu af Kamfóru-drupti, og brúka svo smyrslí þessi ístað hinna, sem hér að ofan er umgætt.

aldrei einö hátt og þeim heilbrygða; sé hesturinn látinn ganga yfir þrepstuldu edur trébút, tekur hann ekki fótinn upp, heldur dregur fótinn eftir sér; sama er tilfallið þegar hesturinn gengur aptur á bak. Séu nú engin merki til bólgu ofantil í bógnum eða nedantil í fætinum við knéð eða hósféggid, og hófurinn er lytalauss, þá er sjúkdómurinn án efa Bóg-magnleysi; bada skal þá allann bóginn 2 svar. sinnum daglega með þessu meðali: tað  $\frac{1}{2}$  pott brennivíns, uppleys þari  $\frac{1}{2}$  lóð af Kamfóru og blanda þar saman við 2 lóðum af Terebintin-olíu; bada skal bóginn, sem nú var sagt, 6 til 8 sinnum daglega, og batni nú kvíllinn þarvið; þarf hesturinn eigi meiri viðgjörðar við. Hjálpi þetta ekki, má brúka þessa olíu: 4 lóð af Linolíu, 1 lóð af Svale-olíu, 3 qvintin af Steina-olíu (oleum petreæ): 1 lóð af Sinasmýrslum (ungv. nervinum) 1 lóð af Regnorma-olíu, 3 lóð af Terebintin-olíu og 3 lóð af Spik-olíu (oleum spicæ) og 2 qvintin af Bictril-olíu. \*) 5 eða 6 daga í rennu smyr madur bóginn með smýrslum þessum og læknast. Bóg-magnleysið þá næstum æfinlega. Væri sjúkdómurinn nú svo gamall, að smýrslin ekki gjörðu gagn, er best að gjöra skurð og setja haunir á herðabladid, sem séu látnar liggja 12 til 14 daga, og þareftir burttafist; sé magnleysið komið af útvortis orsökum, mun það batna þarvið.

---

\*) Þágt mun börndum sem óptast að fá þessi ágætu smýrslu, og má þá í stað þeirra brúka annaðhvort Terebintin-olíu, Einirberja-olíu, Opobeldoc, sterkt Kamphóru-brennivín eða þá sambland af 2 pelum af Rommi og 4 lóðum af Lósiþápu.

Bóg-magnleysið af innvortis orsökum er oft bágð að lækna; hestar fá oft eins og mannesljurnar Íttshli, og þegar svo ber við, að frumefni Íttshliinnar legst að einum lim líkamans, kemur þaraf magnleysi, sem stundum raunar læknast, en kemur þó oft aftur; það vildi því verða bændum óþýrt að upptelja morg og dýr meðal við þessu, sem mjög er hæpid að læknast gæti; betra er þá að láta náttúruna ráða, sem oft með tíðinni ræður bót á þessu, sé hestinum hlið við mikilli brúkun. Oft hefir það að góðu komið að setja stóran hánka á bóginn, hvarvið sjúkdómsins frumefni fær útgang, og er þá best að láta hánkann sitja sem lengst.

## § 8.

## Um Sleidur undan gjörðum.

Þegar fár koma á brínguna, magann eða siðurnar, undan gjörðum, þá verður að þvo þau með fólðu vatni, edur og brennivíni með sápu; betra meðal er þó að taka 3 lóð af Kamfóru-brennivíni,  $\frac{1}{2}$  pott af vatni; þetta skal nú hrista vel saman, og smyrja bólguna með því 3svar sinnum daglega. Som er aðferðin þegar meidslin eru á bríngunni. Komi holdfúli undan gjörðum, skal að öllu meðfara, sem fyrr er sagt um dauda í sárum. Komi bólga, svo þar votti fyrir vog, verður að færa í bólguna og uthleyppa vognum; þó skal þetta ei gjörast, fyrrenn líkindi eru til að grasid sé í bólgunni, finnst það best með því, að fara fingrum um bólguna, og finna hvort lint er fyrir; sturðinn skal ætíð gera svo stóran, að vogurinn óhindrað gæti útslofid. Stundum ber það við, að

kvap kemur undan gjordum, er það ætíð verðjafalaust, og verður þó augvu að síður að fléra það birtu; það gjerist svo, að maður flær krossfurd í flinnid, hvar kvapid er, og flær það svo laust frá flinninu og holdinu svo vel sem verður, þareptir saumast flinnid saman með sterfum þræði, að undanteknum nedri enda krossfurdarinnar; hvar vogurinn má óhindrad gétu runnid út; þareptir þvær maður færid með koldu vatni. Sé þetta á sumardegi, þá hefstar ganga úti hegum, er brætt að rjóðra Þerbintin-olju á færid, svo mybit síður setjist á það. Aðgættandi er, að maður ei flæri neitt burt af flinninu, af hverju fann að koma færi, sem nuggast af gjordunum.

### § 9.

Um Róli framana bringunni.

Frámantil á bringunni kemur stundum bólga; og er þá optast vant að grafa í henni; til þess að flhta fyrir grefstrinum, skal rjóðra á bólguna gæfaleiti, svíðasloti eða ósoltu smjori; þartil bólgan verður linari og vogurinn grefur út; opna skal þá kylid og hleypa út grefstrinum; sjái maður nú um, að færid grói ekki offljótt, og gleymi eigi að rjóðra svíðasloti á bólguna, vátir ei lengi áður tvílli þessi græt að heilu. Stundum verður bólgan svo mikil, að hesturinn á bágt með að ganga, en færi maður eins að, og nú var sagt, er engin hæffa búin.

### § 10.

Um Guðvop (Kneevamp).

Eptir biltur, hogg eða þarsmíði, kemur stundum bólga í kné og framfótinn, sem opt verður að Guðvopi;

lækna má þetta með áburði úr 1 lóði af Spanðflugum og 1 lóði af Euphorbium-gúmmi og  $\frac{1}{2}$  lóði af Operment (auripigmentum); þetta allt skal melja og blanda með 2 lóðum Terebintín-olíu og 4 lóðum svidaflots\*); með smyrslum þessum mafar madur kvapíð einusinni á dag í 3 daga í rób; lofsins lætur madur smyrslin liggja, þartil þau detta af af sjálfu sér, optast losna þá hárin af með, en strax sem hárin aptur vara, verður að bera á kvapíð að nýu; hversu opt smyrslin skuli á bera, er ei gott að ákvarða, því það er mikið komið undir stærð bólgunnar.

## § 11.

Um Sínahnút í framsótunum (Seneslap).

Dpt verða hestar haltir af því, að stóra sinin, sem heigja á framsætturnar, bólgna; þetta skal svo lækna, að taka á 1 pund af muldri raufkrit, 2 lóð af Salmíali, og gjöra af því smyrslu með edíki; þessu skal nú málka á þær bólgnu sínar, og láta sitja utaná hérum fflugurs þyðt; þareptir skal binda með vadmáls lengjum frá hófsfeggi upp að knénu, sem daglega séu vættar í edíki, hvári Salmíal er uppleyst (2 lóð í  $\frac{1}{2}$  potti); þettar þénar til að mykja sinina. Umbúðir þessar lætur madur nú liggja í 2 daga, og leggur, að þeim lidnum, annað nýtt ístadiinn; þannveg, sem nú var sagt, skal aðfara þángadtil kvíllinn er læknaður. Ef kvíllinn er gamall, er hann verri víðgjörðar, þó má brúka meðalíð.

---

\*) Ístadi þessa má brúka önnur aubfengnari smyrsl, tilbúin að jofnum þortum af Terebintínolíu, Lífsísápu og Rómí.



14 daga edur 3 vikur, en skyldi hann þá ekki fara batnandi, má brúka smyrslí þau, sem um er gétid í § 10, og bera þau á 2svarsinnnum daglega; en sjái maður að bólgan er minnð, þá smyrslin eru afherrud, verður að halda áfram með þau. Hjálpi þetta ekki, væri gott að bera á bólguna Sápúbalsam eða Kamfóru-brennivín með Terebintín-olíu. Rohlweß ræður til að gjöra plástur af 2 lóðum af Spansksflugnapúlveri, 1 lóði af Mastixgúmmi, Colophonium, Safranplástri og Terebintín-olíu, þetta bræðist með 6 lóðum af bítí, þartil þar af verður plástur. Plástur þessi er einfalt gott meðal við gamalli bólgu og sína-hnútum; best er að bræða plásturinn í leirpotti, og áður enn hann storknar að fullu, skal hann ábera með þartil gjordum spáða, svo hann gæti þrengt gegnum hárið og skinnid; því beri maður hann einungis á hárin, er það til ónýtis, og sé plásturinn ofheitur, brenna hárin af; lofsins þá ell bólgan er byrgd af plástrinum, bindur maður um með ull og léreptárum, og lætur svo plásturinn sitja þartil hann fellur af af sjálfum sér; leggja má plásturinn á í annað sinn, skyldi það fyrsta ei hjálpa.

## § 12.

Öf Kjúfulidurinn fer úr lídi.

Þessi eru kennimerki, þegar Kjúfulidurinn er genginn úr lídi: hesturinn tillir nidur tanni, og Kjúfulidurinn er boginn framávið, og það er vant að viðvara, þó hesturinn stígi á allan hófinn; þegar hesturinn gengur, hrærist efri partar fótans rofsliga; nokkrir hestar standa þá í

allan hófinn, en adrir tilla einúngið uidur tánni, en i báðum tilfellum beigist hjúkuliðurinn ekki til baka, sem vant er, þegar hesturinn er óftaðaður. Vidamótin skal nú bada med medali þvi, sem um er talad í § 8, og samanstendur af Kamföru, Bli:extracti og vatni; badningunni skal áfram halda, þartil hestinum er batnad. Þegar langt er síðan úr lidi gæð, er betra að búa til smyrslí af 8 lóðum af Regnorma-olíu, 4 lóðum af Sinafalvi og Steinolíu, samt 2 lóðum af Terebintín-olíu \*).

### § 13.

#### Um Kvaphnútt á bógnum (Stollsvamp).

Öfantið á bógnum; þar sem kallast albogalidur, fémur stundum kvilli sá, sem kallast Kvaphnútur albogalidsins (Stollsvamp). Í fyrstunni merktist bólga, vegna hvorrar hesturinn gengur med beinann fótinn, en sem þó optast dreifist; ef maður badur hann med fólðu vatni; en þegar hún er horfin, er þar þó opt hnefðótt bólga eptir á alboganum, sem er full med gulu vatni; bólgan verður stundum að harri blöðru, sem er full med vatni; þegar svo er, má blöðruna framkreyfsta med vinstri handar þumalfingri og fleykfusingri, og stínga svo á henni med beyttum knífsoðði; þegar vatnið er útrunnid, brúfast smyrslí þau, sem talad er um undir Gnékvapi, og þarmed smyr maður kvapið noðrum sinnum daglega, og lætur það að lofunum hánnga við svo

---

\*) Þeir sem eigi hafa þetta, geta brúkad áðurumgétin smyrslí af Ljfsisápu, Terebintín-olíu og Rommi.

lengi, sem það vill tolla og ekki þettur af af sjálfu sér; þannveg læknast þá kvapíð á stuttum tíma.

É þvapíð mjög gamalt, á að taka Spanðflugur, Sublimat (Mercurius sublimatus corrosivus) Dperment (auripigmentum), eitt quintín af hverju þessara,  $\frac{1}{2}$  quintín af Euphorbium gúmmi, þetta blandast nú saman við 3 lóð af svínaseiti. \*) Þegar smyrslin nú detta af, og hárin fara að vara aptur, þá verður að bera smyrslin á í annad sinn, og halda þessu áfram þágangtil hvíllinn er læknadur. Stundum finnst á þessum stad hardur hnútur, sem inniheldur hrognum líka lássu; þá er ekki annad betra ráð, enn burtstéra hnútinn með beyttum knífi.

Það ber opt við, að Bógahnútur kómur á stablaárnada hesta, þá er best að láta hesta þá, sem hafa það, ekki vera stablaárnada, þegar því verður viðkomid. Stundum er kvaphnúturinn mjög stór, eða hann er svo hardur, að eigi verður læknadur edruvísí, nema madur gjöri krosssturd, flái slinnid frá og stéri burt kvapíð; lappana leggur madur nú saman, en flíppir svo miðid af þeim að þeir falli saman; efri og þversturdinn lætur madur gróa saman, þen nedri sturdurinn á að vera opinn til þess að gresturinn gæti útflotid, og þarf nú ekkert annad enn að þvo sáríð með feldu vatni. Rómi holdauki í sáríð, má strá í hann brendu álúni, þartil hann hverfur. Róckrit brúka smyrslí af 2 lóðum Pipar og Euphorbium gúmmi, og blanda þarmed Spil-

\*) Ístad þessa mætti í naubsfalli brúka Dpodelbof.

olíu og Terebintín-olíu, 2½ lóð af hverri þeirra, og 1 quintín af Saltpétursfyrri; með áburði þessum mafar madur kvapíð 3 svar sinnum daglega.

## § 14.

## Um Rótti á hófskégginu (Wolf).

Rvilli þessi kemur í hesta og folold, sem ganga úti í vætum, eda í snjó á vetrardegi, þegar þýdur ganga. Byrjar hann með bólgu um hófskéggid, og með svo sár- um verki, að hesturinn ekki þolir að tilla nidur fætinum; engin ráð eru til að stilla verkin, og verður því að sjá til, að sem fyrst grafi í bólgunni; er þá best að flyta fyrir greftrinum með því að leggja hjæstann háfall við bólguna, og þinda um svo tolli, edur að mafa bólguna með svidafloti, eda annari feiti. Þegar gat kemur í bólguna, sem optast er um kring hófskéggid, þá rennur þar optast nær út illa lyktandi groftur, sem opt etur mikid af skinninu burt; losni það ei frá af sjálfu sér, verður að klippa skinnid af, sem laust er, og bera á sárid það áður umgétna Grænasalve, edur og, ef þetta er ekki til, þá hreint lysi eda svidaflot.

## § 15.

## Um Bólgu í Krónulidnum.

Lidurinn á milli stóru hjúkunnar og hófshvarffins kallast Krónulidur; skéd gétur að lidamót þessi skékist í lidnum, og þá bólga bond þau, er lidnum samanhalda; þetta þekist af bólgu, sem kemur beggja megin við lidinn, svo að hesturinn verður haltur; stundum batnar

hestin, enda þótt bólga naxi, og er það slæmt, því batni hestinum eigi í byrjun kvillans, er skjaldan bata von. Strax sem til bólgunnar merkist, er best að bada líðamótin með smyrslum af 8 lóðum af Terebintín-olíu og 2 lóðum af Rámsfórúspiritus, sem vel á að samanhristast, nær brúka skal; hafi maður nú brúkad þetta í 5 til 6 daga, má hætta um sinn, og brúka svo lýfi eða svíðasflot í 3 daga í senn, að hverjum líðnum, hitt fyrra meðal skal brúkast á ný; eðli má hætta, þó hárin nuggist af, heldur halda áfram, þar til kvillinn er læknaður. Sjálfpi nú þetta alls eðli, má brúka smyrslu þau, sem nefndu eru við Hnékvap, og dugir þá sem optast; en verði það eigi þaunveg unnid með þolinnaði, þá brenna Hestaleknarar með heitu jární, hvað eðli er annara meðferi.

## § 16.

## Um Sófatu.

Kvilli þessi er ofan til við hófinn, kómur þar vílsa, svo hárin detta af; þetta orsakast af óhreindum og kómur af því, að fætarnir verða óhreinir, þegar hesturinn gengur í mýrum, og þorna svo með skarninu á. Best er að þvo fætur hestsins í koldu vatni, og þareptir bada þann veifa lim með þela af vatni, hvári uppleyst eru 4 lóð af Blí-extracti.

## § 17.

## Ef hestar stíga sig.

Það ber opt við, að hestar, sem innstefir eru eða illa járnadir, fá tjúku-meidæli af því, að þeir stíga sig;

lofnar þá optast stór flis af hófnum, og verður að klippa hana burtu, því annars safnast mold og sandur í sárid; þareptir skal bada sárid með vatni og blefi þartil það grær.

### § 18.

#### Um Kjúku-meidsli.

Þau koma annaðhvort af meidslum á kjúkunni, ella og af grestri í fætinum, sem útbrytur á krónunni. Sladi þessi er slæmur, og bezt er, þegar verður, að senda hestinn til Hestalæknis, en verði það ei, má gjöra sem nú segir:

Sé kjúkan færd, verður að skera það stykki af hófnum, sem laust er, því annars gétur það ei gróid; hafi sárin etid um sig víðar í kjúkunni, verður með blýkanna að ransaka stærð og dýpt þeirra, og brenna þau svo allt að botni með glóandi járn; ef fleiri smá got finnast, verður að brenna þau öll; ekki þarf neitt að brúka við hin brendu sár, því þau gróa af sjálfu sér. Þiti madur ei fyrir víst, hvort sárin eru komin af meidslum í kjúkunni, þá verður að gera skurð nedantil við sárid, svo madur gæti komist eptir orsökinni; finnist þar grestur, er bezt að taka svo mikil stykki af hófnum, sem sárid hefir etid um sig. Í sárid hellir madur samblandi af 4 lóðum af brennivini og 1 lóði af Terebintin-olíu; yfir skurðinn lætur madur hamp, og bindur fast um fótinn, þarmed grær nú sárid í kjúkunni, þó stykki af hófnum sé burtstorið.

Þinni madur aungvann groft í sárinum, er að því vísu að ganga, að hvíllinn er kominn af kjúkumeidslum; stundum kemur villifjet í sárid, og skal það burt nema

med glóanda knífi edur og med beyttum knífi, sé madur eigi vanur við ad brúka brennijárnid; hó er þá alltadelnu naudsýnlegt ad hafa brennijárnid við hendina, til ad brenna skurdinn eptirá.

Best eru fjúkumeidsli, sem komin eru af grestri ofan- til í fætinum, þá vogurinn hesir grasid sig nidur med sinnum allt nidurad brjósti hóssins innani hófnum, og etid þar um sig. Sár þessi eru ill viðgjordar og stund- um ólæknandi: Taka skal blýkanna og ransaka gáng sáranna, stundum er ómegulegt ad komast nidur ad botni þeirra, þá þau eru bogin, nema madur gjeri skurdi, svo ad verði komist, med þeim hætti ad madur sker ofan- til ofani fjúkuna nidurávid, og er grofsturinn þá vanur ad renna út; skurdur skal vera fingursbreidur, og med það sama sker madur hornvegginn burtu allt nidur ad skeifunni; med álíka breidum skurdi sker madur nú gegn- um brjóstid, til ad komast ad botni sárins. Það væri advísu mikid gagn, ad brenna botn sárins med járni, en med því ad opt er bágst ad komast ad öllum smáholum í sárinu, má brúka hamp eda táid lin, vætt í skeidvatni, sem leggist í sárid. Til ad stilla ofmikla blóðrás, sem hindrar mann frá ad géta skorid nógu vel, er vænt ad binda sterku bandi ofantil um fótlegginn, því þarvid minskar rás blóðsins nidurí fætinum. Adgætandi er og, ad ei sé skorid ofmikid af fjúkunni, því þá grær sárid miklu seinna; í sárid lætur madur drjúpa nokkra dropa af vatni, hvári Bictrel er uppleyst (3 lóð af Bictrel í 1 potti vatns), og grær það þá um síðir, hó opt gangi tregt.

## § 18.

Um nagla og annað, sem stúngist getur ofdjúpt  
uppi hófinn.

Þegar hestar hafa stúngid sig í hófinn, skal strax út-  
draga það sem stungur hestinn, hvort nagli er eða hvað  
annað; þareptir skal stækka gátid með oddmjóum og  
beyttum knífi, því annars safnast grosturinn, etur um  
sig, og gjörir allt verra; þareptir hellist brennivín í  
holuna og stoppast með hor, og klámylja leggst innan-  
riur utanum fótinn. Sé grostur kominn í fótinn, verður  
að tálga af hófnum, þartil komid er innad grestrinum.  
Þegar hjot vex fram, þar sem hófurinn hefir verid tálga-  
ður, verður að strá á það kalli, þartil hófurinn vex  
fram yfir það. Sé naglinn eða hvað annað, sem var í  
hófnum, brotið eður á annann veg svo lítid, að eigi sjáist  
merki til þess, er best að tálga af hófnum með knífi,  
þartil til holunnar sést; inni holuna borar maður þá  
með beyttum knífoddi, þar til vogurinn útrennur.

Séu hestar haltir eptir járnun, þá skal fleisuna und-  
andraga, verður þá að gefa gaum að öllum neglunum,  
og sjáist á einum eða fleirum þeirra svartir blettir á odd-  
inum, sem kómur af vognum, verður þá að uppbora  
gátid, uns komid er að upptokum graftarins, og þar-  
eptir meðfara, sem fyrr er sagt. Gæti maður ei á  
sagðann hátt fundid á hverjum nagla hesturinn hefir  
blóðjárnast, á hófurinn að klípast með klíputaung um-  
hverfis, og má þá nákvæmlega adgæta við hvort noglasar  
að hesturinn fveinkar sér; þetta skal svo uppbora, uns  
vart verður við greftinn. Adgæfandi er hér, þá heltn



er gomul og gressturinn hefir etid um sig, ella og svo grasid út við frónuna (kjúkuna), er best að færa allt af hófn-um, sem etid er af gresstrinum; forðómi maður það, grær skadinn vart, þar gressturinn etur víðar um sig; um sáríð skal binda einusinni daglega með samblandi af 4 lóðum brennivíns og 1 lóði Terebintín-olíu.

Það ber og stundum við, þegar innri rond skeifunnar þryðir á hófinn, að hestar verða haltir þaraf, verður þá að draga skeifuna undan, og sjá til að færa svo mikið af hófnum, að holt sé undir skeifuna innan til.

## § 20.

### Um Hóf-særi.

Hestar sem ójárnadir eru, verða opt sárfættir, þegar þeir ganga á grjóti; þekkt þá á því, að hesturinn tillir nidur tanni; taki maður á hófnum ofantil, er hestinum þar heitara enn vant er. Strax sem merkt til að hestar þannig verða sárfættir, er nauðsynligt annadhvert að járna þá, því annars gresur með tíðinni í hófnum, og verður þá að meiri skada, eða þá að gjöra 2 skurdi beggjamegin við hóf-tunguna svo djúpt að blæði, og strax sem blóð-rásin stöðvast, á að binda um fótinn kúamykju, og fara því fram þartil allt er gróid.

## § 21.

### Að járna hesta.

Jafna skal hófinn áður enn járnad er, svo skeifan falli allstadar vel við, þó er það ei rétt sem margir smidur gjöra, að tálga ofmikið af hófnum, einkum nálægt hóf-

túngunni, því þaraf verða hestar þá opt sársettir, þegar á grjóti ganga, og það er að aungvum notum. Skeifan á að vera öldungið flétt, svo hún falli allstadar vel við flétta sjel; það er ekki rétt, sem sumir gjöra, að beiggja hælinn á skeifunni, því það gjörir hestinum framar illt enn gott. Randshynlegt er að tálga allar ójesnur af hófnum, sem standa framaf skeifunni, því annars gétur það hægliga fléd, að hófurinn brotni, ef hesturinn rekur tána í eða hrasar. Ekki er gott að hafa hestskónagla mjög digra, því þá hættir meira við, að þeir rífi hófinn og hesturinn blóðjárnist.

## § 22.

## Um Bólgu nedaná Fvidnum.

Til að lækna kvilla þenna, má þetta meðal brúfast: blanda skal saman 8 lóðum af Harpír með 4 lóðum af Brúnellusalti (sal prunellæ) og 1 lóði af Brennisteinshalsami (gratia probatum); af þessu skal gjöra 3 pillur, og gefa svo hestinum elna pillu hvörn 3ja dag fastandi; þegar brúfadar eru 3 pillur, má bida í 8 daga, og sé þá, að þeim lídnum, bólgan eigi horsfin, má aptur gjöra sem í fyrra sinn. Ekki má brúka þetta við færleika, þó bólguna hafi, fyrr enn þær hafa fastad. — Séu hestar magrir, eða bólgan komi eptir sjúkdom og langferdir á lúnum hestum, má brúka duppt af Wélandsurt (rad. Valerianæ) Gentian-rót (rad. gentianæ) og Svannarót\*), jafnt af hverri, og gefa hestinum 2 lóð

\*) Allar þessar urtir vaxa á Íslandi.

af þessu drupti 2svar eða 3svar sinnum daglega; gott er og að setja baunir framan á brjóstið.

### § 23.

#### Um Nabla-Fvidslit á folöldum.

Þegar bólga kemur í nablann á folöldum, af því að idrun falla þar út, kallast það Nabla-Fvidslit. Maður leggur folalbið niður, og um þóka þann, sem er utanum nabla-Fvidslitid, bindur maður sterku seglgarni svo fast sem verður; eigi þarf þá meira, ef þetta er rétt gjört.

### § 24.

#### Um Mar á hestum.

Þegar hestar merja sig á bóggi, lærum eða annarsstadar, sem skóð gétur, þá þeir ganga útum þraungvarðyr á hesthúsum, eða detta á sveili, hellum eða grjóti, og halta þareptir, þá er eigi annað betra ráð enn bada marid optfjinnis með feldu vatni, edur og bera á það Kamfóru-brennivín eða Terebintín-olíu.

### § 25.

#### Um Stríðleika í lærum hesta.

Til fylla þessa geta verið 3 orsakir: hin 1sta er sú, að vöðvarnir geisa eptir og útþenjast um of, svo hesturinn verður haltur; það hefst á því: að hesturinn, sem þó stendur í fótinn, dregur lærið eptir sér, og lendin er að innanverðu þrútin; þristi maður á bólgu þessa, verður hesturinn óþolinneður og tekur upp fótinn.

Þetta læfnast með því, að bada bólguna með Kamfóru-spiritus og Blíhvatni, blöndudu saman til helminga, 3svar sinnum daglega. Verði því viðkomid, er best að láta hestinn vada í vatni allt í taglæretur, og svo standa þar  $\frac{1}{2}$  part úr flúðustund, edur þá bada bólguna iduglega með feldu vatni. 2) Magnleysi gétur komid í fótinn, þegar líða-böndin, sem samanhalda lídnum, geggast; þegar hesturinn þá gengur, ber hann raunar nedra part fótins náttúrulega, en fætinum gétur hann þó aldrei stígid jafnalngt fram sem þeim heilbrygða; opt er og bólga um líðamótin, sem allid er heit. Bada skal þann magnlausu fót með Kamfóruspiritus, Terebintin-olíu og Sápúbálsami, eða þá öllu þessu blöndudu saman, og batni ei þarvid eptir 8 daga, verður að mafa fótinn með olíum þeim, sem um er talad í § 7 og eiga-vid Bóg-magnleysi. 3ja magnleysid gétur orsakað, þegar litil sín, er í midjunni heldur lídnum samfestum, er sundurrifin; bígð er að víta, hvort sínin er slitin edur eigi, og sé svo, eru þarvid engin ráð, því sín þessi vill aldrei gróa saman, og er þá ei annad fyrir eun láta slá hestinn af.

Auk þessa gétur bæði Stt og Krampi orsakað hestum magnleysi, því báðir þessir sjúkdómar leggjast opt í fæturnar og orsaka magnleysi. Sé nú Stt orsef þar-til, er best að setja hánka í lendina, og að öðru falli, sé það Krampi, þá að bera Kamfóru-olíu, Terebintin-olíu eða brennivín á lendina, og gésa innvortis dupt af Bélandsurt, Hvannarót og Meistarajurt, jafnt af hvorri; af þessu dupti géfist 2 lóð 3svar daglega.

## § 26.

Um Snút á Konúngsnefslidnum (Spat).

Þáir af bandum þekja kvilla þenna, og eru þeir því oft í útlandum svifnir af hesta-kaupmonnum á hestum þeim, er hafa hann. Innanverdt á Konúngsnefslidnum merkir maður ærli, sem í fyrstunni er mjög lítid, þetta kalla hestalæknarar Spat; stundum gétur ærlid verið á stærð við hænuegg, og stjaldan finnst sjúkdómurinn í báðum fótunum, stundum eru hestar haltir þaraf, og aldrei er ráðlegt að kaupa hesta, sem hafa kvilla þenna. Eðli merktist ætíð til ærlisins í byrjuninni, er hesturinn þá samt haltur og magnlítill í apturfæti þeim, hvar hnúturinn seinna meir sýnir sig; hesturinn tillicnidur tánni, þegar hann stendur og haltrar fyrst er hann fer á stad, en er hann hefir gengid nokkra stund, ber eigi meira á heltinni. Hestakaupmenn í útlandum brúka það ráð við hesta þessa, þegar þeir vilja koma þeim út, að þeir láta þá aldrei standa fyrra, og ber þá ei á heltinni, svo lengi hesturinn er á hreifingu, en undir eins og hesturinn hefir hvílt nokkra stund, ber strax á heltinni þegar hann fer á stad. Kvilla þenna er illt að læfna, og er það einasta ráð að brenna hinn veika stad, og er þá bezt, þegar því verður viðkomid, að koma hestinum til Hestalæknis; en verði það ei, þá er bezt að brúka smyrslí þau, sem ráðin eru við Kvaphnúti § 13.

## § 27.

Um Ærli á Konúngsnefslinu.

Ærlid er annaðhvort stórt eða lítid, og kemur eptir mar undan heggum eða biltum á Konúngsnefid,

ellegar það orsakast af innvortis orsökum. Strax sem verður vart við það, skal mæla það með Kamföru-brennivini eða Sápuspíritus; batni það ei þareptir, skal mæla það með smyrslum þeim, sem áður eru ráðlegð við Hné-koapi, 2svar sinnum daglega. Som er aðferdin, komi koap nedantil við Konungsnefid á háfínina, er stundum gétur orsakad að hestar verði haltir. Séu kvillar þessir gamlir, er það einasta ráð að brenna þá með brenni-járni.

### § 28.

#### Um Bólgu í apturfótunum.

Bólga, sem stundum kemur í annann eða báða apturfætur, byrjar optast að nedanverdu, og færirst svo uppeptir; kemur hún af því, er hestar standa lengi kyrrir; sé bólga lítil, hjadnar hún eptir badning með feldu vatni, en sé hún stærri og nái hærri uppi fótinn, er best að setja noðrar baunir í fótinn, og dreifir það optast bólgunni. Líka er gott að gefa hestinum píllur þær, er um er talad við Bólgu undir kvíðnum § 22. Sé bólga í báðum fótum, verður að setja baunir í þá báða. Stundum kemur bólga í bæði Konungsnefs-lidamótin, hana skal bada 3svar sinnum daglega með smyrslum af Blýextracti 4 lóðum, Kamföru-brennivini 2 lóðum og  $\frac{1}{2}$  potti af vatni. Opt dreifist bólga þessi bráðum, en kemur þá aptur eptir noðra daga; til að hindra þetta, er ekkert betra ráð enn setja baunir í fótinn, og er þá bráðum bata von.

## § 29.

## Um Vilsu í Rjúfúlíðnum.

Þegar 'grastar' vatns-vilsa safnast á tjúkuna upp- undir hárunum, þá kemur optast bólga í fótinn; stund- um etur vilšan meira um sig umkríng líðamótin, og fær- ist uppeptir fætinum; naudsýnlegt er þá að afklippa öll hárin, og þvo þá veiku stadi, hvar vilšan útrennur, noct- rum sinnum daglega með vatni, hvafi Vicitril er uppleyst (nl. 4 lóð Tárnvicitril í 1 potti vatns). Sé bólga í fæt- inum, er naudsýnlegt að setja baunir, og gefa hestinum Laxerpillu, sem tilbúin sé af 2ur lóðum af Alúni, 2 lóð- um Winsteinbrjóma (Cremor tartari) og 1 quint- ini af Salapparét; þetta allt skal nú steyta í dupt og blanda með sápu, og gjöra þaraf pillu; að 8 degum líðnum skal aptur aðfara, sem nú var sagt, og ei gleyma að þvo hestinum með vatni því er að framan stendur. Bólga, sem kemur í fótinn, hjadnar af sjálfu sér, þá vilšan er hætt að renna, en verði það ei, þá skal brenna hestinn, þar sem bólga er, með brennijárni. Komi villikjot þar sem vilšan útrann, verður það að burt nema með glóandi knifi.

## § 30.

## Um Stertbrot og Taglveiði.

Þegar sterturinn brotnar, vex hann optast saman af sjálfum í sér, en verði það ei, og komi groftur, svo grafi í stertinum lángs með rósubeininu, er best að of- skera stertinn, og stöðva blóðrásina með brennijárni.

Rjotærli kómur stundum undir taglid, og verður það þá burt að stéra, svo ekkert verði eptir, og þarðosan strá hreinu falki í sárid; vogurinn má daglega þrost burt með volgu vatni, og læknast það þá bráðum. Stundum rennur vatnsvilsa út af stertinum, og verður að stórum skurfum í taglinu; þetta er slæmur kvilli og næmur, þar heilbrygdir hestar gæta fengid hann af þeim veikfu, og lifist hann mikid kláða. Kvilli þessi læknast með semu meðolum, sem brúkud eru við kláða og skurfum.

### § 31.

#### Um Rótt.

Þau byrja með bólgu undir flinninu, svo það áþenst, og bólgan er heit átofu. Bólgu þessa skal mafa 2 svar sinnum daglega með svína eða svída-slóti eða og ófæltudu smjóri; verði bólgan nú lin átofu, er það merki til, að grasid er í hýlinu; best er þá að slinga á því með mjóum hnífðoddi og úthleyppa vognum; stúnguna er best að gjöra nedantil, svo grofsturinn betur gæti útrunnid. Mafa verður hýlid daglega með ádurteisdum sinyrslum, og sjá til að opid eðli lokist fyrirrenn hýlid er gróid nedanfrá.

### § 32.

#### Um Kláða á hestum.

Strax sem vart verður við kláða, er best að flíja þá veikfu hesta frá þeim heilbrygdu, ef því verður viðfomid, einkum má gæta að þessu á vetrum, þegar hestar



standa inni, því annars veðist hver af öðrum. Það er mikil undir því komið að fódra hesta vel á vetrum, sem þenna sjúkdóm hafa, því slæmt heyr er þeim mjög óhollt og gjörir kvíllann verri. Eðli er það gott, sem margir gjöra, að taka blóð hestum þeim er kláða hafa, heldur skal mæla þá 3 svar sinnum daglega með 2 lóðum af kláða-smyrslum, sem þannveg tilbúast: "taf Brenni-  
steinsdupt 4 lóð, granasápu 8 lóð, hrær þetta saman og blanda þarvið svo miklu af vatni að úr því verði mjúll smyrslu"; með þessu skal mæla kládann, sem fyrr er sagt. Sterkari verður þessi áburður, ef madur til 8 lóða af því áður umgétta bætur 1 lóði af Hellebórus-  
rótar dupti (*vera trum album*). Smyrslin lætur madur nú sitja á þeim stöðum, hvar kláðinn er, uns þau hinn þriðja dag eru þveigin af með volgu sápuvatni; hjálpi þetta eðli í 1ta sinni, smyr madur kládann að nýu með áburði þessum, og fer svo að sem nú var sagt, uns kláðinn er læfnabur.

Gott er að fundleggja hesta, sem kláða hafa, í sjó, en aðgættandi er, að það má ei sté nema á sumar-  
degi, þegar hlýtt er í sjónum. Margir setja baunir á kvíð hestsins, og er það einka gott. Ahold og reidþji, sem brúfud hafa verið, verður að þvo í sjó eða sápuvatni, því annars gétur stéð, að aðrir hestar verði veikir af þeim; er ástundum verra að fyrirbyggja það, enn að lækna sjálfan sjúkdóminn.

Noðrir brúka við kláða á hestum smyrslu af svina-  
feiti og Terebintinu, og eru þau líka einka góð; en optast er þó nóg að mæla þá stöð, hvar kláðinn er á,

með Þjísísápu, og þegar það hefir gjört verid í nokkra daga, þá þvo hestinn vel í volgu vatni.

### § 33.

#### Um Offsa-kláða.

Stundum sækir sá offsa-kláði á hesta, að þeir nudda sér upp við stokka og steina, svo hár og skinn ástundum losnar; alloptast er þá ekkert að sjá á skinninu annað enn hesturinn væri heilbrygdir, og skjaldan er hann líka veikur; kemur þetta af óhreiniðum í hárinu og skinninu, og læknast best við að sundleggja hestinn iduglega, samt taka honum blóð á halsæðinni, láta bláða 1½ pott, og nú á stöðina, sem klæa, með sápuvatni. Merkist þar á móti til smá-kyla og nabbá á skinninu, er best að mafa þá með þeim í næstundang. Þú umentolustu smyrslum, og þvo þar á eftir í sápuvatni. Komu kláðinn í taglið, verður að kemma það og greiða, svo þar safnist ei skarn á milli háranna.

### § 34.

#### Um Lúsa-veiki.

Þess safnast helst á hesta, sem lengi hafa stöðid í sveltu, eða eru mjög magrir; naudsýnlegt er því að fóðra þá vel, og mafa svo stöði þá, hvar lýsnar eru með Skvakasilfurð-smyrslum (ungvent Neapolitanum), eftir 12 tíma drepast lýsnar þá, og má þá þvo hestinn með volgu sápuvatni.

## § 35.

## Um Gringorma.

Ymisleg merki hefir sjúkdómur þessi: byrjar hann opt með smá hnútum, í hverjum að grefur; á sumum hestum eru hnútarnir lengri, og grefur þá líka í þeim, en stundum ekki; opt ber það og víð, að einn eða annar limur bólgnar, detta þar þá á sár, sem þaðan í frá útbreida sig víðar á stépnunni. Strax sem vart verður við tvílla þennar, er nauðsynlegt, ef verður, að aðskilja hestinn frá þeim heilbrygdu, sem annars fá hann líka; þareptir skal tilbúa dýpt af 8 lóðum Ammoniak-gummi (gummi ammoniacum) 4 lóðum af Spidsglands-púlveri (antimonium crudum) 2 lóðum af Brennisteini og 4 lóðum af Hvannarötur fræi, þetta skal hræra í vatni, svo úr því verði sem þyð kássa, og þaraf gefa hestinum 2 lóð 3svar um daginn.

Sjáist merki til að hnútarnir verði að sárum, verður að brenna þá með brennijárni, og máka svo sár-id í tjöru undireins og bruna-skorpan er affallin; séu sárin laung, er bezt að strá í þau hreinu kalki, áður tjaran sé áborin. Þannveg, sem nú var sagt, skal aðfara um hesturinn er gróinn, en gæta þó jafnframt að hann fái gott og óflemmt fóður; það gerir opt mikil gagn, að setja á tvíð hestjins noðrar baunir strax í byrjun sjúkdómsins.

## § 36.

## Um Sár.

Skylði svo viðbera, að ólmir hestar flyðju yfir túngarða eða ennur gérði, og fengju þarvið sár á tvíð-

inn, svo idurin útféllu, verður strax að leggja hestinn niður, tóma þormunum inn, og sauma svo fyrir, en saumur sá gjerist svo: að taka skal mjóa stónal nokkud beigða, bræða hana með sterkum horþræðieda seymi, og stinga henni svo ígægunum báðar varir sársins, og hafa hêrumbil fingurs breidd milli hverrar stúngu, og gá vel að, að nálin eigi snerti þarmana; endarnir, sem eptir hverja stúngu eru affkornir, skulu nú bindast saman, þar sem hvor liggur á móts við annann; þareptir skal optsinnið daglega bada sárid með feldu vatni til að fyrirbyggja bólguna. Strax sem sárid er gróid, skal útdraga þræðina, samt meðan sárid er að gróa gefa hestinum smátt storna tedu.

Öll stór sár í kjetinu, hvor vogurinn frítt gétur útrunnid, læknast vel, ef þau iduglega eru þveigin með feldu vatni; en ødrufífi er því varid, ef taugar eða sínar eru sundurfkornar, er þá gott að láta drjúpa í sárin Terebintín-olíu.

Rómi sár um lidamótin, svo gul-leitt vatn renni útaf sárinu (það er: lidavatnid), þá er þetta hættulegt. Ef bólga kémur í lidamótin, skal bada þau með samblandi af  $\frac{1}{2}$  potti af Blæxtracti og 1 potti af vatni. Vatn þetta skal velgja í hvort sinn sem það er brúkad; hjadni nú bólgan, er bezt að mafa lidamótin með svidafloti; hjálpi þetta alls eðert og kómi uppdráttur í fótinn, skal smyrslí gjöra af 2 quintinum af Spanssflugna pulveri og 6 lóðum af Svínaseiti eða óseltuðu smjori, og með þessu mafa hinn veikta lim.

## § 37.

## Um Beinbrot.

Sé fótur eða lærleggur á hesti brotinn, þá er þar ekki lækningar von, og þessvegna ei annað ráð enn að slá hestinn af.

## 3 Kapítuli.

Um innvortis sjúkdóma á hestum, þeirra einlíani, upptök og lækningarmáta.

## § 1.

## Um Grosasótt (Kveisu.)

Sjúkdómur þessi er algengur á Íslandi, og verður morgum góðum hestum að bana, einkum þeim sem ridid er. Upptök sjúkdómsins eru þannig: hesturinn hættir að jeta, stappar með fótunum, og flær þeim ástundum upp undir kvidinn; hann fastar sér nidur, en liggur þó skjaldan lengi; þegar sjúkdómurinn verður verri óróast hestinum ennú meira, hann fleygir sér nidur, fastast um á hmsar hliðar, réttir frá sér sæturnar og ber höfudid mjög órólega. Strax sem vart verður við þetta, skal taka hestinum blóð á hálsæðinni, og láta blæða 1 pott, þareptir skal taka handfylli af Kamomillu-blómstrum, (Flores Chamomillæ), sjóða þau í 1 potti vatns, sía sendid frá og blanda þarí 4 matskeidum af lýsi, 2 lóðum af Saltþetri og gefa hestinum í einu. Séu Kamillu-

blómstur ei nærri, má í þeirra stað brúka litid af Hvannarótar fræi, edur og Hafrafúpu blandada með lysi, sem fyrr var sagt. Einka gott er og að setja hestinum stólpipu með lysi, volgu vatni edur óseltudu smjori, blendudu með Saltþétri; gott er að láta 2 eða 3 theskeidar af Kamfórudropum í stólpipuna, hafi madur þá við hendina; eðli veitir af, að til stólpipunnar séu teknir 1 eða 2 pottar, og í hvern pott ætti þá að hafa þridjung lysis eða ósaltads smjors. Stólpipa er í mörgum dýra sjúkdómum eittthvort hið ágætasta hjálpar meðal, og ættu allir bændur, sem hafa margar sképnur og vildu hjálpa þeim, að vera sér í útvegum um hana; skal aptanvið bæfking þenna verda gétid hvornin hún á að tilbúast og brúfast. Þegar fveisan eðli vill batna, verður að itreka stólpipuna að hvorjum  $\frac{1}{2}$  tíma lídnum. Verði ei viðkomid að setja stólpipu, má taka skéggfápu, og skera þaraf aslaung stykki, sem séu legud álíka og litid egg, mafa þau svo með salti og lysi, og stinga inni þarfa-gánginn, svo langt sem verður, gæti hesturinn nú tadt, má samt itreka þetta aptur.

Dýralæknarar gjöra miðmun á fveisu eptir hennar ýmislegu orsökum, og telja þaraf 4 hefudtegundir nefnil: 1) Fveisa sem kémur af bólgu í gornunum; 2) Fveisa sem kémur af sína-drætti; 3) Fveisa sem kémur af vindi í gornunum (Windfveisa), og þeklist á því að hesturinn er upphendur mjög; og 4) Fveisa sem kémur af hægdaleysi. Gjóra skal við allar þessar tegundir sem áður er sagt, og einungis gæta þess, að við fveisu, sem kémur af bólgu í gornunum, og sem þek-

ist á því að lifæbin slær harðt og hesturinn er ákaflega óþyrinn, verður að láta blæða í meira lagi, og ítreka blóðstökuna optar. Noðkrir ausa vatni á kvíðinn, hvað sumum þykir þó óráð \*).

## § 2.

### Um Þvagteppu.

Þessi sjúkdómur þekktist á því, að hesturinn stendur sem hann vilði piśsa, án þess þó að gæta það; fari maður með hendina iuni þarfagánginn verður hann strax var við blóðruna, sem er mjög full og útspennt. Tilfni til veikleika þessa er annaðhvort sínadráttur (Krampe) í vöðva þeim, er lofar blóðrunni, eður steinar sem safnast hafa í blóðruhálsinn. Í sjúkdómi þessum er allt undir því komið að hestinum sé hjálpad sem fyrst, því annars springur bláðran og hesturinn deyir; það stéður á þann hátt, að maður setur hestinum stólpípu með volgri Haftrasúpu og lýsi, eða vatni og lýsi, eys fólðu vatni yfir hrygginn og lendina, og hjálpi það ei, makar maður hendina með óföltudu smjóri eða lýsi, fer með hana, sem fyrr er sagt, inni þarfagánginn og þrýstir nú á blóðruna framanfrá aptur á við. Hjálpi hverugt af þessu, verður strax að leita Dýralæknis, ef hans er kostur.

## § 3.

### Um Klums.

Eptir Conferenceráðs M. Stephensens fáluga

---

\*) Sjá Lector Witts Haandbog i Veterinair = Videnskaben.

frásögn \*) hefir þessi hættulega veikni gengid sem Land-  
farfótt 1805 á Íslandi; segir hann svo: að sjúkdóm-  
urinn hafi byrjad með megnri Keldufótt, áksum hita,  
hofudverki og hjartslætti; hjartad hafi barist, sem það  
ætladi að springa, og endalokin urdu, að hestarnir urdu  
klumfa og dóu eptir 3 til 8 daga, án þess að geta etid  
nokkud á heim tíma. Dýtar hefir hitt þó verid, og er  
algengt, að færleikar, sem nýlega hafa fastad, og eru  
brúfadar um of, fá gjarnan kvilla þenna, og byrjar þá  
veiki þessi svo: að hesturinn gétur ei lofid munninum  
upp, hann verdur klumfa, taglid er bogid, og apturfæt-  
urnir stírdur eins og staurar, hálsinn stírdur nú lifa,  
og froduflúm kómur fram á milli tannanna; lofsins  
stírdur hesturinn upp og deyir innann stamins. Til-  
efni til veikni þessarar geta verid ýmisleg: ósmikil brúf-  
un á færleikum, sár einkum þar sínar eru undir, að  
miklum svita flái inn, og fleira.

Þútt er að lækna kvilla þenna og opt ómegulegt,  
þó er þess helzt von í byrjun veikinnar; best er þá að  
taka hestinum vel blóð á hálsæðinni, og láta blæðanokk-  
ra potta, lata hann inni hesthús og klúa að henum sem  
best verdur, svo honum verði heitt; stólpípu skal honum  
setja af volgu vatni með lyfi, og láta  $\frac{1}{2}$  quintin af Kam-  
fóru í hvorja stólpípu; þetta skal itreka hvorn 3ja klukk-  
utíma. Séu kjálkarnir ei fast samanlindir, skal reyna  
að gefa hestinum inn Opiumsdropa (Tinct. opii sim-  
plex) og Kamfórudropa, blandada saman, hérumbil

---

\*) Veterinaire Selskabs Skifter 1808, pag. 286.



1 matsteik af hvorjum, og streka þetta hvorn 4 fluckstima; semuleiðis á að mafa hálsinn með volgu lýsi eða oliu, einkum sínarnar. Noðrir taka 2 lóð af saltþétri 1 quintin af Kamföru, steyta það í duft, hræra það út í graut, og gefa hestinum það 4 sinnum daglega\*). Falli svo að klumfið fari batnandi, varir það opt lengi, og þarf þá hesturinn góðrar hjúfrunar við um þann tíma, og einkum ridur á að sjá til, að eigi slái að honum kulda, verður því að þekja hann með brekkanum eða öðrum vöðum.

Conferenceráð M. Stephensen sálugi segir, að noðrum hestum hafi batnað í fyrr umgétinni hestapest 1805, ef þeim var tekið daglega blóð, sett stólpipa og látnir drekka volgt vatn, áðurenn fjálfarnir urðu fastir saman.

#### § 4.

##### Um Kölduveiki (Seber).

Kölduveiki er ei svo algeng á hestum á Íslandi, sem annarskadar, þó ber við hún verður að faraldri, einkum á vetrinum, til að minna veturinn 1833, einkum sunnan og austan á landinu. Veikleika þessum getur verið ymislega varid, og er annaðhvort Igérðarveiki eða Rotnunar sótt, en þó mun sú seinni vera skjaldgæfari á Íslandi.

Igérðarveikina taka gripirnir með kuldaþrolli og skjálfta; hesturinn eingir sig saman og stendur í somu sporum, þareptir verður hann ákaslega heitur og þorst-

---

\*) Sjá Lector Witts Haandbog i Veterinair-Videnstaben.

látur; augun eru skjær og sljóta í vatni; hann hvettilr að jeta; lifædin slær harðt og tídt; kvidurinn þembist upp. Tilfæni til kvíllans eru ýmisleg, til að minnda: ósmíkil brúkun, ómegnt hey eða ófeldi, ef að hestinum slær, þegar hann er mjög sveittur. Best er sem fyrst að taka hestinum blóð og láta blæða 3 eða alltaf 6 potta; þareptir skal gefa hestinum að drekka vatn, hvári Saltþétur er uppleystur, hérumbil 1 eða 2 lóð í einni fetu vatns, en sé hann ei til, má brúka salt í Saltþéturs stad; þareptir skal setja hestinum stólpípu með haf-rasúpu og lýsi, eða volgu vatni og lýsi, samt alltaf sjá til að hann hafi nóg að drekka.

Rotnunar sótt byrjar einnig með feldu, en hó eigi svo megnri sem í Tgjordarsóttinni; hesturinn er ákaflega magnlaus og gétur varla stöðid; þegar hann gengur skjógrar hann á ýmsar hlíðar; lifædin slær ótt og tídt, en er mikið lin; hesturinn fær sótt, og er hún optast nær blóði blandin. Það var einmitt þessi kvílli er almennur var á hestum 1833 í Árnesshélu og víðar um land. Best er strax í byrjun kvíllans að taka hestinum blóð, og láta blæða 2 eða 3 potta; þareptir skal setja stólpípu, sem adur er sagt, láta hestinn vera í feldu húsi, og gefa honum góðan mola (hérumbil 1 quintin) af Kamföru 3var sinnum daglega; sjá verður til að hesturinn hafi nóg að drekka, og er best að gefa honum vel súra blöndu af ediki eða sýru, svo mikið sem hann vill drekka; hafi maður Hvannarót, má taka hana, skera ofursmátt, taka þaraf 2 lóð og 1 quintin af muldri Kamföru og ein smíð af Saltþéttri, þetta skal hræra

saman við graut af mæli eða höfrum og gefa hestinum 3svar sinnum daglega. Það ber opt við í veikri þessari að blóðið vill safnast til hinna innri parta, og er því opt naudsýn, sem fyrr er sagt, að taka hestinum blóð.

## § 5.

## Um Bólgu í heilanum.

Sterkir og feitir hestar fá helzt þenna sjúkdóm, og gétur hann komið af því, að hestum er ridið um of í megnum hita, edur og að þeir eru bardic um höfudid; þó mun þessi sjúkleiki skjaldgæfur á Íslandi. Einkenni sjúkleikans eru þau, að hesturinn verður galinn og leitast ástundum við að drepa sig. Strax sem merkist til kvilla þessa, skal hestinum blóð taka á hálsæðinni og það í meira lagi, ausa mörpum vatnsfötum yfir höfud honum, setja honum stólpipu og hlífa við allri brúkun.

## § 6.

## Um Bólgu í lungunum.

Hesturinn þessir felduhroll og hósta, sem orfast, þegar þrist er á barkafylid; hann þolir ei að liggja, stjegrar allur að aptanverdu; þúlsin er optast fljót og nockud hord. Orsakir geta verið, að kulda slær að hesti, að honum er ridið mikid á móti hvessum vindi, eða brjóstgjardirnar eru girdtar fast og fl. Strax sem verður vart við veikleika þenna, skal losa allar gjardir á hestinum, hlífa honum við allri brúkun, taka daglega blóð 2svar eða 3svar sinnum, setja stólpipu af hafrasúpu,

falti og bræddu smjori, og gæfa hestinum 1 quintin af Saltpétursfyrri 3svar sinnum daglega.

### § 7.

Um Mýrnabólgu, eda Mýrna-íggjörd.

Mýrnabólga þeckist á megnri koldusótt, hverri að fylgir mikið sviði, hesturinn verður stírdur og hálfhaltur á apturfótunum, hann verður magnlaus og sigur niður með apturhlutann og gétur ekki reist sig. Þetta er almenn veifi á ferðahestum á Íslandi, og falla menn það allmennt Sli g; var það fyrrum eignað draugum, apturgaungum, vondum öndum og fleiru þessháttar, þess vegna settu menn krossmark með tjöru á lend ferðahesta, hvað þó litid gat hjálpað fæpnunni. Kvilli þessi kénur oft á feita hesta, sem eru brúkaðir um of, merkist alloppt ekki til neins, fyrr enn ádurtöld tilfelli koma allt í einu, sem optast nær eptirad hestinum hestir orðið ofkalbt. Strax sem vart verður við veifi þessa, skal hestinum blóð taka og það í meira lagi, og er oft þörf að itreka það fleirum sinnum; þareptir skal stólpipu setja af lyfi, hafraseidi og salti, samt, ef faung eru á, gæfa inn Saltpéturspúlvur í grjóna-hastra-eda bygg-seyði, og láta hestinn drekka svomikid sem hann vill af vatni, úr hverju þó áður skal taka kalbakulid.

### § 8.

Um Sardsperru.

Gjúkðómi þessum, sem optast kénur á unga hesta,

fylgir meiri eda minni kuldi, hesturinn verður stírdur í framfótunum, og á mjög hágt með að ganga; apturfætturnar setur hann lengra fram undir foidinn enn vant er, og er gangur hans því lifastur, sem apturfætturnir ættu mestann þátt þari; séu allir fætturnir jafnveikir liggur hann optastnær; ætíð eru fætturnir í þvella þessum heitari enn vant er. Veiki þessi orsakast af ofmikilli bráfun helzt á ungum og feitum hestum; gétur hún líka komið af því, að sveittum hesti verður ofkaldt. Séu mikil bregð að þessu, verður að draga járnin undan hestinum; þareptir skal taka honum blóð í meira lagi, einkum sé hann feitur og megn koldusótt fylgi hardsperrunni; um fætur hestsins skal ausa koldu vatni, og láta hann svelta í 2 eda 3 dægur; gott er og að mafa fætturnar með Kamfer-olíu, eda ef hana vantar, þá með lýsi, samt gefa inn salt annaðhvort með hafra-grjóna eda bygg-seyði, eda, hvað handhægara er, láta setja honum stólpípu af Horbleðfuseyði með salti og lýsi. Þegar hestinum fer að skána hardsperran, verður að fordæst að láta hann ganga á miklu staggryti eda vera lengi ójárnadann.

## § 9.

## Um Geyfótt (Lunge- Betændelse.)

Einkenni veiki þessarar eru þessi: hestinum er þungt um andann, hann hefir jafnadarlega hósta og hryglu, og mæðist strax við minnstu áreynslu; nasirnar eru útspentar og rifbeinin ganga upp og niður. Umsar eru

orsakir til veikis þessarar, en optastnaer er það annað-  
 hvert gomul Þágnabólga, miglab og skémmt hey, edur  
 og að hestur sveittur hefir orðid innkúlfa. Hafi veikin  
 varab lengi, er kvíllinn opt slæmur viðgjörðar; en sé  
 hesturinn við góð hold, skal strax blóð taka og láta blæða  
 1 pott, velja honum gott og létt hey, og itreka blóð-  
 tokuna í hverri vífu; séu ráð til þess, skal maður kaupa  
 noður lób af Ammoniac-gummi og eins mörk af Brenni-  
 steins blómstrum (*Flores sulphuris*) og steytttri sópu,  
 þetta allt skal samanblanda, og gefa hestinum þaraf 2  
 lób, hrærðu saman við málgraut, 2svar sinnum daglega.

## § 10.

## Um Wálg.

Það ber optar við að fólald enn fullorðnir hestar  
 fá kvílla þenna. Einkenni hans eru þessi: fólalðid eða  
 hesturinn missir hold og hamsa, það liggur mífid og  
 bitur sig í hliðarnar eða ber í þær með taglinu, eins og  
 það vilði berja þaðan mybit eða flugur; en það óbrigð-  
 ulasta einkenni er það, þegar ormar sjást í tadinu.  
 Gjera skal seyði af Gentianrót (*radix gentianæ*) Hvanna-  
 rót og Þorblöðfu í sterkara lagi, þari skal nú uppleysa  
 salt, blanda þarvið noðru af óseltubu bræddu smjóri  
 eða lyfi, og setja þaraf stólpipu. \*) Streka verdur nú

---

\*) Sérumbil 1 lób af hverri rót þessari fyrir sig skal sjóð-  
 ast með 1 potti vatns niðurtil 3gja pela, og er þetta  
 þá náttulegt í eina stólpipu.

Þetta optar, einfanlega í svolengi áburtseld einkenni ormanna ekki eru horfin.

## § 11.

### Um búðhlaup.


Þú ber það að hestar fá Þíffýðisnert einkum af megnri töðu á vetrum edur og á gróanda á vordag. Séu ei mikil brögð að kvilla þessum, er hann ekki skadlegur, og má þá álítast sem náttúrunnar velgjörningur, og er þá eigi annað verðt að gjöra enn að gefa hestinum létt fóður og í minna lagi. En fylgi kvilla þessum Rótnunarsótt, edur og að hann vari mjög lengi, svo þraptar hestsins fari minlandi, þá skal gefa seyði af Blóðrót, Múrum og Ballhumli, edur og setja hestinum stólpípu af því; má þá gjöra það sterktara og linara eptir því sem edli sjúkdómsins er varid.

## § 12.

### Um Hófudsótt (Koller.)

Hestaveiki sú, er Danir kalla Koller, og hér kallast Hófudsótt hesta, kemur af því, að ofmikil blóð safnast fyrir í heilanum, edur og í heilanum er vatn eða beinæxli, sem þrista á hann, ella í þridja lagi að sólar-geislarnir hafa í gegnum augun gjört flæma verkun á heilann. Einkenni sjúkdóms þessa eru: hesturinn líta sem hamir og fer varla úr sporunum; teimi maður hann úr stad, ber hann fæturnar hátt, og hengir hófudid niður í jerdina; þegar hann fer að bíta, tekur

hann með græðgi í grasib, og heldur svo tuggunni í munninum án þess að tiggja hana, svo hún fellur opt úr manni hestfins aptur ótuggin; þó maður taki framfæturnar og setji þær á viri, þá stendur hann í sömu sporum. Þetta kalla Dýralæknarar Døðkoller. Verði hesturinn þarómóti vitlaus uppúr þessu, kalla þeir það rasende Koller; sú tegund sjúkdómsins líkist mjög Bólgu í heilanum, sem um er gétid í § 5. Þessi þessi kómur helst á hesta, sem hafa ofmikil fódur, og oflitla hreifingu, edur og hún gétur komid af ofmikilli brúfun, einum í megnum sólarhita. Undireins og vart verður við áþurteld sjúkdómsins einkenni, skal taka hestinum blóð á hálsæðinni, og láta blæða 2 eda 3 potta; þareptir skal gefa 1 lób af Saltpéturs-dupti 2svar sinnum daglega, þartil veikina linar.





## 4 Kapítuli.

### Um Rýr og Mautpening.

Það er ei lítið undir því komið að velja kálfa til uppeldis undan góðum mjólkur-kúm, og er það ópt til stórs fjáða fyrir bændur að þeir vanda það ástundum ei sem fjylbi. Það er meining Dýralæfnara að því gu-  
 kálfa fjali velja undan góðum mjólkur-kúm, sem fjaldan verbi feitar, þó vel aldar séu; þáramóti vilja þeir láta velja gríðung & kálfa undan góðum mjólkur-kúm, sem þó ætíð haldast vel við hold; því eftir þeirra meining er og svo mikil undir því komið, að gríðungar séu af góðu kyni, og eigi brúfadir fyrirrenn þeir eru. Egja vefra. Einkenni á góðum gríðungi eru þessi: hofubíð á að vera stutt og sterkt, fallegt og lýtalaust; augun skjær og hrein; enníð breiðt og hálsinn digur og sterkur; allir vöðvar sterkir og stórir; fætturnir lágir og sterkir og brjóstið breiðt.

Edi stendur á neinu hvæær kálfar eru aldir, en mikil er undir því komið, að kálfar séu vel fóðradir, því annars verða það aldrei fjépnur að gagni. Maudsynlegt er að gæfa kálsum broddinn, því hér er því álíka vara íð og með manninn, að móðurmjólkinn má ætíð álitast sem sannfallað læknismedal fyrir úngvidin; kemur það af því, að broddurinn hjálpar til hægdanna, og hindrar þannveg saurindi frá að gæta sáfnast fyrir í gornunum, hvað ella gétur ollad mikils ills, margra veikleika og jafnvel ástundum dregur þá til dauða. Í þeim 1ta mánuði skal gæfa kálfinum móðurmjólkina spenavolga eins

og hún kemur frá túnni; þegar hann er líðinn má smátt og smátt venja kálfinn til undanrenningar og mysu, þó er betra að gefa kálfinum það ei kaldt, heldur svo, að úr því sé tekið kalda kulid, þángadtil kálfurinn smátt og smátt er vaninn til að drekka kaldt; einfa gott er að blanda drygð hann, er kálfar fá, með grjóna-bygg-eda mæl-mjólk, því það eykur framferðeirra og vext; smámsaman skal svo venja kálfa til að jeta hey, og má þó í fyrstu velja það gott; best er þartil velþurkud smá tada. Umfram allt ríður á því, að kálfar eðli svelti í uppeldinu, því þá verða aldrei úr þeim stépnur að gagni, og er það ei lítill skaði fyrir búanda; það er því ætíð ómakjins verdt að vanda fóður þeirra, samt halda þeim hreinum og þöðalegum, svo eigi komi í þá óþrif, hvað seinna meir gétur gefid tilefni til ýmislegra veikinda.

Allir bændur á Íslandi vita hvað best hentar með fóður fyrir nautpening, og þarf eg því eigi að fara þar um mörgum ordum, en einúngis geta þess, að þegar harðt er um hey, má gefa nautum korn, hris, vðir, kál, kartoflur, þáng, marhalm og fl. Dýralæknarar ráða til að blanda salti í stémt hey, og skal það þá verða heilnæmara.

Það ber oft við að þyr láta kálfi, og eru þartil nærfeldt hinar sömu orðsafir sem til þess, er færleikar fasta fyrir timann; það gétur og komid af því, ef kúm er beitt úti hrimfrost, eða þær standa á votlendi, hvar-eptir þeim verður ofkaldt.

Ef þyr geta eigi borid kálf sinn, er það optast af

lífum orsökum og áður er umgétid við færleika, er eigi gæta fastad. Hjálpa skal þeim þá til að skiljast við kálfsinn, og er þá einmitt hin sama aðferð hér, sem þar var umgétid.

Skortur á góðu vatni er mjög skaðligur fyrir nautpening, gétur það gífur tilefni til Miltis- og Lúngna-veifi; það er því nauðsynlegt, ef stéð gétur, að sækja vatnið lengra burtu, edur og grafa brunna, hvar líkindi eru til að gott vatn sé undir.

## 3 Kapítuli.

um útvortis sjúkdóma á Nautpeningi, þeirra einkenni, tilefni og lækningarmáta.

### § 1.

#### Um Tönnurnar.

Þegar þyr ekki vilja 'jeta, er nauðsyn á að gá að tennunum, og ber það þá stundum til, að maður finnur að þær eru lausar, og sé svo, skal taka 2 lóð af Alúni og hella þar á sem svari 4 matæidum af sjódandi vatni, og þegar Alúnið er uppleyst, skal blanda þar við 4 lóðum af Húðangi eða bræddu hvítasifri; þegar þetta er búid, skal þessu rjóðra á tannkjötið 2 svartsinnum daglega; aðgætandi er það hér við meinafst jarlarnir, því

framfennurnar eru aldrei svo fastar; þó ber það opt við, að þær verða opt fastari við áðurtalid medal.

## § 2.

### Um Rnéþvap.

Þvilli þessi er almennari á nautpeningi enn hestum, og kémur það til af því, að þessar sképnur setja nidur knéd þegar þær skulu reisa sig á fætur, er hér þá ell hin sama aðferð, sem gétid er um við tvílla þenna á hestum.

## § 3.

### Um nagla og annað, sem stúngist gétur uppi fæturnar.

Þafi naglabrot, smáir steinar, tréslisar eða annað þvilíkt stúngist uppi fætur á nautpeningi, þá verður strax að draga það út, fléra skurdinn upp, hella þarí Brennivini eða Terebintin-olíu; þareptir skal vesja um fótinn upptánum hampi og ríum, svo óhreiniendi eða annað eigi gæti komist inni sárid.

## § 4.

### Æf úr lídi fer.

Þari aptur-eða framfótur úr lídi, verður strax að kippa honum aptur í lídinn; þegt er þá að láta sképnuna eigi gánga úti, og bada fótinn iduglega með fólðu vatni, flaka eða snjó.

## § 5.

## Um Sár á Nautpeningi.

Sár koma annadhvort af gömlu mari eða meidslum, en hvort sem heldur er, er ætíð nauðsyn að sjá til, að vogurinn ei safnist fyrir í sárinu, einkum sé það mjög djúpt; verður því, ef það er mjótt og djúpt, að gjöra það stærra með beittum knífi, svo grofsturinn óhindrad gæti útrunnid; þareptir skal seyði gæra af Vallhumli í sterkara lagi, væta þarí línslaf, leggja í sárid og binda svo yfir með rúm. Rómi holdsfúri í sárin, skal strá í þau mulinni Myrru eða brendu Alúni, og fara þvínæst fram því næst var umgétid.

## § 6.

## Um Bóli.

Nautpeningur fær opt þyli á fjálfana eða framana hálsinn; þan grafa fjálfan út af sjálfu sér, heldur verða þau opt að hordum ærlum, sem seinna gæta orðid að meini. Það er því ráðlegast, strax sem verður vart við þessi þyli, að raka burtu hárin, og mæka þau með svidrasloti eða lýsi, þartil þau verða lín átofu; má þá stinga á þeim með beittum knífi, og er þá best að gjöra skurðinn nógu stóran, svo grofsturinn allur gæti útrunnid; þegar það er gjört, skal daglega hella í sárid sjó eða fæltu vatni, og grær þylid þá bráðum af sjálfu sér.

## § 7.

## Um Bólgu í Júvritnu.

Þegar þyr eru nýlega félsdar eða hafa nýborid fá þær opt bólgu eða þrimla í júvrid; naudsýnlegt er þá að mjólka túna 3svar sinnum daglega, og bera á júvrid mykandi smyrsl, tilbúin að jofnum þertum af Þaurbærslu og Althea-smyrslum (ungv. althææ); sé það ei til, þá skal taka Lambablóm (*Saxifraga oppositifolia*), eða ef það er ei að fá, þá Smára (*Trifolium repens*) hérumbil 2 lóð af hverju sem er, skera það ofursmátt og sjóða saman við 4 lóð af bræddu smjori; með þessum smyrslum skal nú mafa júvrid nokkrum sinnum daglega. Hafi maður góða Kamföru, þá segir Þróf Abildgaard hana einka góða til að eyða þessháttar bólgu, og ætíð ættu bændur, sem hafa margar flepnur, að eiga Kamföru í húsum sínum.

Rómi bólga eða mjólkurþrimlar í spenana, er öll hin sama aðferð, sem hér er umgétid, og ridur mjög á, elgi ekki verr að fara, ekki að fórðma hana. Eptir Conferenceráðs M. Stephensenss sál. frásögn er tvílli þessi mjög allmennur á Íslandi, og sjálfur hefi eg óptsinnis ferd hann; víðsi eg það opt að góðugagni koma, að taka næpur eða gular róur, sjóða þær í vatni, steyta síðan með smjori, láta þetta innani klút, og binda það, svo heitt sem maður þolir: að lagt sé á handarbað sér, við júvrid; það má gjera á þenna hátt, að 2 bondum sé bundid í horn klútsins, og þau svo bundin saman ofantil á

hryggnum. Naudsynlegt er að velgja þenna róubagst-  
ur upp nóttum sinnum daglega.

### § 8.

Um Sprúngur í júvrinu og spenunum.

Í þurrum og heitum sumrum fá þyr, sem jafnad-  
arlega ganga í mýrlendi, sprúngur í júvrid og spen-  
ana, bera þær sig þá oft illa þegar mjólkadar eru.  
Sprúngur þessar er best að mafa með Blýhvitu-smyrsl-  
um (Ungventum Cerussæ); en sé það ei til,  
þá skal smyrslu gjera af smátt storum Ballhumli eða  
Blóðrót, fodinni með nýju óseltudu smjóri, og bera þau  
á sprúngurnar. Stundum kemur skorpa á spenana, og  
er þá naudsynlegt að mafa þá vel með svidafloti eða  
nýju smjóri.

### § 9.

Um blóduga mjólk.

Blóðblandin mjólk getur komid af ofmiklu blóð-  
rifi, eða þaraf að þyrin er óvarlega mjólkud, hvarvid  
æðarnar sundurristast. Þegar þetta orsakast af blóðrifi,  
þá heyr þad oft við, að því þessi varir lengi. Best  
er sem fyrst að taka kúnni blóð og láta blæða 3 eða 4  
merkur. Komu þetta þar á móti af því, að æð hafi sprúng-  
id í spenunum, þá skal júvrid badast með feldu vatni.

### § 10.

Um Kláða.

Kláði kemur helst á gamlar þyr, sem fá slæmt og

lítið fóður; þó gétur og svo það að hver tú fái hann af annari. Kálfar, sem hafa seltið, fá hann líka opt. Stundum kemur hann á fyr, sem gefið er illa þurkad eða miglad myrlendis hey; það er því ætíð mífilsverdt að gefa góðann gaum að tilefni kvilla þessa. Komi fláinn af sulti, verður að gefa nautpeningi betra fóður, ef faung eru á því, og skal þá fá í heidið nöðrum lóðum af Brennisteinsdupti og steyttum Einirberjum, hérumbil 1um eða 2ur matsþónum í senn; þegar búid er að gefa nautpeningi dupt þetta nöðra stund, skal smyrja alla þá stadi, hvar fláinn er, með Þýðisápu, sem blendud sé með Brennisteinsdupti, eða eintómu Þýð með Brennisteini; í hvors stad að brúka má, ef Brennistein vantar, Lóbakssösu, sem á er borin á líkan hátt; þegar þetta er gjort 3 daga í senn, þá skal hinn 4da dag smyrslin af því með volgu sápuvatni. Udgætandi er, að séu það kálfar eða úngvidi, sem fláðann hafa, skal fá áður umtaladi flamtur af Brennisteinsduptinu og Einirberjunum vera teluverdt minni.

Það ber opt við að fláði er mjög þrálátur, og ráða Dýralæknarar þá að setja baunir framand hóstina og bógana.

Þegar fyr eða kálfar hafa fengið fláða, þá er nauðsyn á að stia þeim frá hinum heilbrygða nautpeningi, því annars fær hann hann líka; best er því sem fyrst að taka fjúklínginn og láta í annað hús, verði því með nöðru móti viðkomid, því komist kvilli þessi á í einu fjósi, svo að



hver fyrir fái hann af annari, þá er hann mjög leiddur, og stendur nautpeningi stórum fyrir þrifum.

## § 11.

### Um Lús á Nautpeningi.

Þegar lús sækir á nautpening, þá er hin sama aðferð og áður er umgétid í § 34 um lús á hestum.

## § 12.

### Æf fyrir verða gældar.


Það er skjaldgæst að fyrir verða gældar, án þess að á heim sjáist nokkur veikni-merki; stendur það ástundum nokkrum mánuðum eptirad þær hafa dorið, og það nær-feldt allt í einu; þetta kemur optast af meltingarveiki, sem orsakast af því, að túnni er gefid alltof mikið af sterkri og megnri tödu, edur og að heid, sem fyrir fær, er miglad og fordjarfð; þó ætla eg að það fyrsta muni optar vera orsökina á Íslandi; heyrdur eg opt bændur, er vel gáfu nautpeningi, klaga yfir því, að fyrir ei mjólk-udu hjá heim eins vel og öðrum, er verr færur með þær; hafi eg síðan séð, að orsökina er náttúrleg, og óska að Landar minir gefi vel gætur að því, er eg nú segi.

Þegar á fyrir er borið um of, fer álíka fyrir heim og monnum, sem eta yfir sig, þær jeta meira enn þær geta melt, liggur svo heid hálfmelt í maga og gornum, og veikir á þann hátt meltingar-verkfærin; næringarsaftin verður þaraf þvævari, fyrir feitari og holdugri, en mjólkur langtum minna; það er því ráð hér-

við, að bændur ei beri svo ákæft á fyr eptir kálfsburðinn, eða gefi þeim mjög meгна tödu, heldur blandi hana með nokkru af góðu velpurfudu úthevi, og sjái jafnframt til að fyrir fái nóg að drekka, því á dryknsum ridur henni fullt eins mikid og á fóðrinu.

Til eru meðol, sem bæði auka mjólk og lækna melt-ingarveiki, og er það Rúmen-fræ (*Semina carvi*); það vex óvída á Íslandi, eg hefi hvergi séð það nema í Skálholti, hvar tóluverdt er af því; veit eg þaraf, að það gefur allvel gróid á Íslandi; vilda eg ráða öllum bændum að fá til jurtar þessarar í kálgerdum eða tún-um sínum, því bæði er það, að jurtin er ágæt í mat, og líka er hún einka gott meðal í tédum kvilla á túnunum; skal hana þá brúka á þann hátt, að maður tefur nokkra matspæni af fræinu, og lætur það í heyid bæði kvöld og morgna.

Dyrælæknarar gefa kúm, er gældar verða, hérað-aufi 8 lóð af Glaubersalti í vatni strax á fastandi maga, 3 morgna í roð; þareptir taka þeir 12 lóð af Eifarberks-dupti, og einsmikid af steyttu Rúmen-fræi, og 12 lóð af raudu Entlandupti (*Pulv. rad. gentianæ rubræ*), þessu blanda þeir öllu saman, flípta því í 24 parta, og gefa í einu einn skamt í hálsfum potti vatns.



## 6. Kapítuli.

Um innvortis sjúkdóma á Nautpeningi,  
þeirra einkenni, tilefni og  
lækningarmáta.

### § 1.

#### Um Búkhlaup.

Stephensen segir hvílla þenna mjög algengann á Íslandi, og skal hann einkum verða hættulegur á kálsum, sem opt deya þaraf. Tilefni hans er optast flæmt fóður, eða ef kulda flær að nautpeningi, og sé þetta tilefnið, þá verður að reisa skordur við því, og hlýa betur að í fjósinu. Af innvortis meðolum er Blöðrót (Tormentilla) eitthvört hið besta meðal við Búkhlaupi; skal af dупti hennar gefa 1 lóð í vatni 2svar sinnum daglega, og því framfara þartil Búkhlaupid hættir. Kálsum skal gefa hálfu minni samt enn hann er nú var tiltekinn.

Kálsum, sem eru aldir á mjólk, er einkum hætt við að fá Búkhlaup, og verður það heim, sem nú var sagt, opt að bana. Séu þeir ei eldri enn hálfmánuðar, skal gefa heim fvoð og morgna hálfst qvintin af Rabarbara-rót með 1 qvintini af Magnesia, edur og ádurtafíð Blöðrótardupst, ef hitt er ei til. Fylgjandi meðali hrösa menn mikillega: Tak 2 lóð af Ent-

ianrótar dupfi, heill þará hálfum potti af sjódandi vatni, og lát svo sjóða nokkra stund; seyði þetta skal nú frásia og blanda þari 2 quintinum af Opiums-dropum; af þessari blöndu gæfst nú kálfinum einn mat-spónn annannhvorn klukkutíma; en sljótari verkun skal þó meðal þetta gjöra, ef maður tekur Kólúmbus-rót (Radix columbo) í stöðinn fyrir Optian-rót.

## § 2.

### Um Gardlífi og Idragift.

Stephensen segir að veiki þessi drepi margar þyr á Íslandi, og vita menn sjaldan hvað til ráða er. Þessi eru einfénni sjúkdómsins: þyrin hættir að jeta, stýnur og andar blína ódt, sparkar með apturfótunum í jörðina, og litur til beggja hlíða sér, snarar sér niður, stendur annadhvort strax upp aftur, eða liggur og stýnur þungann. Undireins og vart verður við einfénni þessi, á að setja kúnni stólpípu, sem um er talad í 3ja Kap. § 1, á hverri hálfri stundu, svo á undireins að taka kúnni blöd á hálsæðinni; en líni veikinni ekki af þessu, á að taka 3 handfyllir af Kamillublómi, og sjóða í 3 pottum vatns, láta í seyðid 1 mörk af Vinolíu eða lyfi og 1 lóð af Saltpéttri, og gefa gripnum þridjúnginn af þessu adrahverja klukkustund. Hafi menn Djesladrygð (Asa fætida), á að uppleysa hálfst lóð af honum í sjódandi vatni og blanda í seyðid. En sé nú hvorki Kamillublóm, Saltpétur né Djesfulsdrygður fáanlegur, þá á, svo sem áður er

sagt, setja stólpipu, taka blóð og gefa inn nokkra matspæni af Kamföru-brennivini, edur Kamföru-dypt á hnúfsoddi.

### § 3.

#### Um Upphembu (Trommesyge).

Stundum verða fyrir svo upphembdar, að þær standa á blístri, og eru þaraf mjög veikar. Besti þessi orsakast af sterku, brendu, megnu og ofmiklu heyi, sem súrnar í inniblynnum. Best er, strax sem vart verður við kvilla þenna, að setja kúnni stólpipu, og gefa henni 2 matspæni af Steinolíu í 1 pela af brennivini; mjög ridur á að stólpipan verki og fyrir fái góðar hægdir, á hún því að itrefast annann hvern tíma, þartil fyrir fær hægdir. Dpt hjálpar nú þetta eingaungu, en skyldi nú af því vera, þá er sú einu hjálp til ofurs, að stinga á kúnni með þartil gjordum bor í skeidum (Trokar), sem þannig er tilbúinn: Borinn sjálfur er gjordur úr jární eda stáli, sivalur og álífa þykkur sem litli fingur manns; skeidar á að gjöra eptir bornum af látúni eda sílfri, sem mega vera nokkra styttri en borinn sjálfur, svo oddurinn standi útúr heim. Bornum, sem er haldid álífa og nafri, er nú stúngid ásamt með skeidunum á þaf inni vinstri síðu á kúnni, hérum þverfingurs breidd frá mjódminni, síðan dregur maður borinn út og fer þá loptid útum skeidarnar, sem eru látnar sitja í fárinu hýrumbil 1. eda 2 klukkustundir, svo

ad allt lopt, sem inni fyrir er og safnast fyrir, gæti útrimst. Udgætandi er, að á öllum gripum, sem þetta er gjört, verður að binda apturfætturnar vel og vandlega, svo gripurinn ei gæti flegid og barist um með heim; best er líka að láta hann liggja á hliðinni; en vilji maður slinga á kúnni og láta hana standa á meðan, þá er nauðsynlegt að halda upp öðrum apturfætlinum, svo hún ekki gæti flegid með hinum fætinum. Þegar fleidarnar eru útdregnar, þá græst sáríð af sjálfu sér, en ætíð er gott að bada það með feldu vatni.\*)

Það er ópt íllt að fá Steinolíu á Íslandi, og má brúka í hennar stað Hvannarótar-brennivín, nefnilega, brennivín, sem lengi hefir staðid á Hvannarót; brúfast það þannveg, að maður annaðhvort hellir af því nokkrum matsþónum í senn í gripinn, eða lætur hálfmörk af því í stólpípuna í stabinn fyrir Steinolíuna.

## § 4.

### Um Gardsperru (Sorfangenhed).

Þegar nautpeningur etur lítið eða ekkert, hættir

---

\*) Röðlver ástæur það harla nauðsynlegt fyrir alla bændur að eiga bæði stólpípu og bor þenna, sem hér var frásagt. Hann segir líka að margir hafi fundid að því, að hann láti fleidar borðsins liggja svo lengi í sárinu, en hann færir góð rök og ástæður fyrir aðferð sinni í því efni. Egun og mynd borðsins og fleidanna sést á töblunni, sem er. aptanvið bækling þenna.

ad jörtra, þegar henum er kaldi á eyrum og fótum, þá er það merki til Harðsperru. Hægt er að gjöra við kvilla þessum, og læknast hann optast nær þegar gripnum er tekið blóð á hálsæðinni og látið blæða 2 eða 3 merkur. Kálfum, sem eru hálsæða eins árs, má ei láta blæða meir enn hálfmörk.

Kálfum, sem ennþá er gefin mjólk, á að gefa 1 quintin af Saltþétri 2 þvar sinnum daglega í vatni, þartil þeim batnar. Kálfar fá þá opt sótt, sem ekki má stöðva hina fyrstu 3 daga, en vari hún lengur, má aðfara sem sagt er í 6 Kapít. § 1.

Þættulegur er kvilli þessi, þegar nautpeningur, auk þeirra hér umgétinu fennimerkja, stírdnar upp á öllum fótum og hniprar þær undir kviddinn, þegar hann stendur; nauðsynlegt er þá að taka vel blóð og sjóða 4 handsyllir af Blóðbergi eða Wellandsjurtarblómi (*Valeriana officinalis*) í 4 merkum vatni, sía svo og gefa þeim sjúka gripni helming þess í einu, edur og í þess stað nokkra spæni af sterku Kamfóru-brennivini; síðan á gripurinn að þekjast með vöðum eða brekkanum, og fæturnir að núast vel með þuru heyi. Næsta dag gefur maður hinn helming seyðisins edur og Kamfóru-brennivinið og nyr fæturnar á líkann hátt sem fyrr; hjálpi þetta ekki, skal baun setja framana brjóstið, og láta gripinn ganga úti, ef sumar er. Hafi kviga eða kálfur kvilla þenna, má ei blöð taka meir enn svári 1 mörk, og gefa hálfu minna af seyðinu enn áður er umgétid.

## § 5.

## Um Långnabólgu.

Långnabólga fémur af ofmiklum kulda, hráslegnu eða mig'udu heyi; sé þetta tilefnið, verður að hrista heyid vel og hella á það seltu vatni, en betra er þó að gefa nautpeningi, sem veifur er, betra hey, þegar því verður viðkomid. Hafi gripurinn fljótann og ordugann andardrátt, verður að taka blóð á hálsæðinni, setja stólpipu, og blanda í heyid duppti, að jofnum þortum af Brennisteins-blómstrum, malinni Eintianrót og Piparrót, eður og hræra dupptid af þessu öllu til samans við Hunáng eða sirúp, gjera úr því kásu og smyrja af því, sem svori Lóu-eggis stærð á tunguna kvöld og morgna; sé dupptid sjálfst eingaungu gefid, þá er nægilegt að taka 1 gödann matsþén af því í einu og blanda því í heyid bæði kvöld og morgna.

Ef ofmikill kuldi er orsök til sjúkdómsins, þá er venja í útlöndum að gefa gripnum öl og hunáng eða sirúp, hvæðeb fémur að góðu gagni.

## § 6.

## Um Gulu á Nautpeningi.

Þegar nautpeningur hættir að jeta og jörtra, og munnurinn og nasirnar að innanverðu samt augnalokin verða gul, og tadid og þvagid þaradæði er gult, þá er þetta víss vottur þess að nautpeningur hefir Gulu. Best er, þegar nautpeningur fær kvilla þenna,



ad fæðra hann með mýrlendis eða öðru léttu heyt, og þarabauki gefa honum inn hvorn 3ja dag laxer-medal, svo sem: 1 lób Alóe, 2 quintín Salapparót og 4 lób af Glauber-salti; þetta allt á að melja í smátt drypt, og gefa inn allt í einu í 1 potti af vatni. En sé nú þetta medal ekki að fá, verður að brúka Laxersalt 5 lób í 1 potti vatns, edur, ef þetta lífa vantar, þá hella 2 pottum af sjó í nautpening, og fara því fram uns dagar.

Þegar nautpeningur þannveg er ordinn hreinn innan, á að gefa honum inn 1 matsþón af tjeru í vatni daglega, uns kvíllinn batnar,

Stundum ber það við, að kvílla þessum er samfara Þifrabólga; eyrun verða þá feld, munnurinn heitur og þur, og allur kroppurinn mikil heitur, hjartad slær harðt og tídt, og gripinn þyrstir mjög. Þegar svo er ástætt, á strax að taka blód á hálsæðinni og láta blæða 2 merkur; síðan á að setja baun framand hóstina; innvortis á að gefa drypt af 1 lóði Saltpéturs, 2 lóðum af Glaubersalti og 1 quintíni af Rabarbara, þetta á að blanda í 2 merkur vatns og gefa svo inn 3svarfinnum daglega. Scinna meir, þegar gripnum fer að skána, er nóg að gefa téd drypt einusinni eða 2svar finnum á dag; optfinnis er þó þessa ekki þörf, þaræd tjeruvatnid hjálpar opt eingaungu.

## § 7.

Um Tgjörðar-bólgu í Zeilanum (Hjernebetændelse).

Beikleiki þessi kemur optast af megnum sólar-

hita, mun hann raunar vera sjaldgæfari á Íslandi enn í öðrum heitari londum, þó held eg að eg hafi einu sinni orðid var við hann á einni fægu upp til dala á Vestfjörðum. Kennimerki hans eru þessi: Augun verða framstandandi stær, munnurinn er heitur og tungan full af slimi, eyrun og hornin eru heitari ean vant er, hjartad slær harðt og tídt, gripurinn bitur ekki, en himir og hengir hofudid nidur í jörðina í fyrstunni, en verður síðan ódur og fær sinatengjur í alla útlimina.

Strax sem merkið til veifi þessarar, á að taka blóð á hálsæðinni, og láta blæða vel, hérumbil 3 merkur; síðan á að gefa gripnum inn 2 lóð Saltpéturs í vatni 3var sinnum daglega, og þarófsan setja stólpipu, samt líka undireins setja baun á höstina. Hofudid á að badast með feldu vatni iduglega. Ef gripnum skánar ekki á öðrum degi, þá skal blóð taka á hinn hálsæðinni og láta blæða 2 merkur: jafnmikid á að taka hinn 3ja dag, ef sjúkdómurinn varir við; semuleidis á að brúka stólpipuna, og gefa Saltpétur inn, sem fyrr er sagt, uns að sjúkdómurinn batnar.

Verði gripurinn svo ódur, að bágt sé téðri hjálp við að koma, þá verður annaðhvort að bida uns æðid hjálidur, edur og að öðrum kosti að binda hann, svo hann ei gæti skadad sjálfann sig eda aðra, en þó ridur á því, að hann ekki liggi lágt með hofudid.

## § 8.

## Um Nyrnabólgu (Nyrebetændelse).

Nyrnabólga hefst á því, að gripurinn vill ekki jeta, freppir sig saman og setur fæturnar undir kvidinn, hjartad slær hardt, þvagid er klárt og hreint, en í minna lagi; ef þrýst er á hrygginn hvar nýrun eru undir, þá kennir gripurinn til, og þar merktist meiri hiti enn annarstadar á kroppnum. Fáir þyr kvilla þenna, þá hætta þær að mjólka.

Til að lækna þenna sjúkdóm á að taka blöd á hálsæðinni og láta blæða 2 merkur, samt þarabauki gefa inn hálstannad léd af Saltpéttri í vatni, hvörn eyktartíma, og setja st. lípu daglega. Á hrygginn, hvar nýrun liggja undir, á að leggja léreptériur, sem sífeldlega eiga að vatast með fólðu vatni. Þegar gripnum fer að flána, er nóg að gefa honum Saltpéturinn 1 eða 2 svar sinnum daglega.

## § 9.

## Ef Nautpeningur etur eitur.

Hafi þyr etid eitur þá hætta þær að mjólka, stappa með fótunum nidur í jördina og gjóta augnum nidur undir kvidinn; stundum fleygja þær sér nidur og stynja þúngann; noðrar verða ástundum éðar, en aðrar blása mjög upp.

Þið besta ráð, sem almenningur getur haft mæti eitri, er að taka 2 merkur nymjólkur og blanda

heim saman við 1 merk af Vin- eða Bém-olíu, og gefa stépnunum þetta inn á hverri stundu.

### § 10.

#### Um Orma.

Þegar nautpeningur verður magur, sparlar oft með fótunum uppundir kvidinn, ber mikid til beggja hlida með halanum og gytur augunum jafnadarlega til kvidarins, þá eru mikil líkindi til að þetta sé orma merki. Efki verður kvilli þessi læknaður með ydrumóti enn með Orma-fræi (*Pulvis vermifugus*), sem kaupa verður annadhvort á Apótheki eða hjá læknirum, þaraf á að gefa fullordnum nautpeningi hálfstannad lóð, en kálsum hálfst lóð daglega.

### § 11.

#### Um Lúngnaveiki.

Kvilli þessi, sem almennt kallast Heyfótt á Íslandi, er mjög hættulegur, og verður hann mergum stépnunum að bana bæði þar og annarstadar. Það er almenn meining Dýralæknara að sjúkdómur þessi komi af 2 orsökum, sem eru þessar: 1) Rigningarsamar og votar árstíðir, láglendi og mýrlendi, sem oft liggur undir vatni, miglad og stémmt hey, faggafull fjós, sífeld þoka, óhollt vatn druckid úr mýrar- og stödupollum, sem á sumrum fyllast með allra handa smákvíkindum; þegar fleiri naut drekka af sama polli, þá gruggast upp í pollinum, og smákvíkindin,

sem annars sitja á botninum, fljóta innanum vatnið. 2) Kvilli þessi kemur í heilbryggðann nautpening, sem samgaungu hefir með öðrum nautpeningi, sem veifur er af sama kvilla; þetta sýnir að veifi þessi er mjög sóttuæm.

Dýralæknarar gefa hmiðleg ráð móti sjúkdómi þessum, en morgum er svo hattad, að bágt mundi því við að koma á Íslandi; þó er verdt, þegar kvilli þessi er mjög algengur að gefa gætur að fylgjandi athugasemdum: 1) Að láta nautpening liggja inni um nætur á sumrum, þó á fjósið að vera þurt, rúmgott og saggafrítt. 2) Þar, sem mýrlendt er og vætusamt, væri best að beita kúm á þurlendi eða fjallendi, og láta þær sem sjaldnast koma niður á mýrlendið. 3) Gott er og að blanda salti í Skarfa- eða Garða-kál, og gefa peninginum lítið eitt af því við og við, það er einka góð vörn á móti sjúkdómi þessum; sé kál eigi til, er Einirber eða storin Hor-bladka blönduð með salti allteins gott. Sé skemmt eða miglab hey orsök til veifi þessarar, verður að hrista það vel, lífa er einka gott, þegar svo er, að væta heyið lítið eitt með fjó eða feldu vatni. Nauðsynlegt er lífa að sjá til að nautpeningur eigi dregi af fúrum mýrapollum, gætur nautamabur best varnad því, ef hann daglega á hverjum morgni, þegar nautpeningi er hleypt út, strax vatnar honum í góðu rennandi vatni, svo sem læf eða á.

Þegar Seyfsótt er komin á nautpening, þá eru merki hennar þessi: áðurenn gripurinn verður veifur,

fær hann hósta, og því veikari fyrir verður, mjólkur hún minna, hóstinn verður nú verri og andardrátturinn fljótari, og lýstin til að bíta og jeta fer nú minni andi; leggi menn flatann lófann á vinstri síðuna nedantil við herðabladidi, þá merkja þeir að hjartað slær bæði hardara og tíðara enn þegar gripurinn er heilbrygður; bakhlutinn ridar af magnleysi. Af öllum þessum kennimerkjum má ráða að Tígðar-bólga sé í lúgunum.

Í þessum sjúkdómi er nauðsynlegt að taka nautpeningi blóð á hálsaðinni og láta blæða 3 merkur; síðan á að setja hánka framaná brjóstid; innvortis á að gefa 2 til 3 lóð af Saltpetri uppleystum í vatni 3svar sinnum daglega. Fari svo, að hóstinn, mæðin og hjartslátturinn eðli minni við þetta, þá á aptur blóð að taka á 3ja degi. Þegar ádurtalin sjúkdóms tilefni eru minni, þá má taka dúpt af Svannarót, þurskudum Einirberjum, Hórbloðku og Brennisteini, jafnt af hverju, blanda því saman og gefa þaraf sjúka gripnum 3 lóð 3svar sinnum daglega í vatni, og fara því fram daglega, uns sjúkdómurinn er batnadur. Þegar nautpeningur nú fer að geta jetid, er best að að velja honum það hey, er honum fellur best, þó má það hverki vera ornað né miglad; gott! er og að hræra nokkud af mjóli úti vatninu hvaraf hann á að drekka, en opt er bágð að fá sképnur til að drekka það, og verður þá að gefa þeim hreint vatn. Nauðsynlegt er að sjá um, alltaf standi vatn hjá sképnunni, svo hún geti druckid svomikid sem hún vill.

## § 12.

## Um Miltis-bráddauba (Miltbrand).

Íasavel þótt menn falli sjúkdóm þenna svo, þá fylgir honum ei ætíð dauði í miltinu; en opt fá gripir, er af honum deyja, dauða í lifur og lúngu, magann eða garnirnar. Heit og ákaslega þur sumur, stortur á vatni, eða þá stémt vatn, eða mikill kuldi á vetrum, geta gésíð tilefni til þessa sjúkdóms. Veiki þessi byrjar svo, að fyrir jeta litid eða ekkert, hætta að mjólka, eyrun eru köld og seigt slím rennur útúr munninum, munnurinn er heitur, hárin standa úti loptid, augun eru dauf og vogur rennur útúr þeim, hjartad slær hardt og tídt. Þessi kénimerki láta sig þó ei ætíð í ljósi, og stundum merkjast þau alls ekki, deyr gripurinn þá optast nær allt í einu, án þess menn hafi orðid varir nokkurra veikindamerkja hjá honum, og áður enn honum verður hjálpad; þegar svo er, kémur dauðinn optast nær fyrst í miltid. En þótt ádur talin kénimerki merkist, er samt opt bágð læfningu við að koma, og opt deyr stépnan mjög hastarlega; þessvegna er það naudsýnlegt, þegar menn sjá hin fyrstu kénimerki, strax að reyna til að fyrirbyggja sjúkdóminn með því, að fyrst á blóð að taka á hálsæðinni, og láta blæða fullar 2 merkur, setja baunir framáná hóslina, og gefa gripnum 2 lóð af Saltpéttri, uppleystum í vatni, á hverjum morgni í 10 eða 12 samfleytta daga. Baunin á að liggja fullann hálsann mánud, en þó stíptast um dagliga.

Þessi maður þarómöti á kénnimerkjunum að tvíllinn sé byrjadur hjá sképunni, þá á allt að einu sképunni blóð að taka, setja baun og gefa Svvarsinnum daglega hálfstannad lóð af Saltþétri í vatni, og blanda þarí Hunangi eða Sirópi; semuleiðis á að setja stólpípu Svvarsinnum daglega. Afalli veikin um vetrartíma, er best að halda gripnum vel heitum, gefa honum létt hey, smátt, gott, grænt og vel þurkad úr hey eða tödu, en þó í minna lagi; sé vor eða sumartími og ei faldt, á gripurinn að ganga úti, en ef inni stendur, verður hann að hafa nóg að drekka. Hafi sjúkdómurinn ei farid batnandi á edrum degi, er þessi þaraf, að hjartad flær harðt og tídt, þá er ei annað fyrir enn að taka blóð að nýu, setja stólpípu, gefa Saltþétur, og svo framvegis, uns tvíllinn fer batnandi.

Eg vil ei undanfella að rita hér nokkur orð eftir þeim nasufræga Dýralæknara, Statsráð Wiborg, hvar hann í riti sínu um Miltisbrand og Kúaveiki segir svo: Þessi veiki, segir hann, er megn Tgérdarkalda (Bestændelses-Feber) sem fljótt færir með sér dauda í inniblum, lúngum, miltinu og lifrinni; flestallir sképnaur géta fengid hana, og hver sképna fær hana af annari, og enda fólkið stundum af sképnum. Þessar kénnimerki eru þessi: sképnan ostrar, ber nidur fótunum, dettur nidur, fær sínateggur og deyir með froduna í munninum. Stundum géta líðid 3, 5 eða 7 dagar, áðurenn sképnan deyir, eða lengur. Heit og þur sumur, þá harðt er um vatn, vætusamir og upp-



þornadir mjórlendis stadir geta gésid tilefni til veikis þessrarar, semuleidis. Flémt fódur, illa þurkad og miglad, eholt lopt í fjósum, hesthúsum edur fjárhúsum, flakad hey, flémt vatn og svo framv.; lífa fær hver flépnan þenna kvilla af annari, sem fyrir var sagt. Gægra er að fyrirbyggja veikis þessa, enn að lækna hana þá hún er komin. Gæti maður uppgetvað til-efnid til veikinnar, verður að kosta kappi um að koma í veg fyrir það; seitum flépnunum á blóð að taka, setja á þær hánka, og ausa á þær feldu vatni 2 svar eda 3 svarsinnum daglega. Morgum flépnunum á að gæja seyði af styrkjandi rótum og borkum, svo sem af víðarberki, eikarberki, Malurt, Kamómillu-blémsstrum, hvori blandist edik eda brennivín, þannig, að í 1 mörk af seyði þessu hellist 1 pelli af brennivíni og 1 af ediki. Þeir, sem ekki hafa ráð til þessa, geta gésid nautpeningi hreint vatn með litlu af salti. Þó flépnan skjálfi, á maður allt að einu að ausa yfir hana feldu vatni, og nú á þarófan með heyi. Ef flépnan er stór og sterk, á henni blóð að taka og láta blæða 2 eda 4 merkur; blódtakan á að itrekast eptir blóðsins náttúru, því hafi það þýðva bláa himnu, á aptur blóð að taka, að 5 eda 6 tímum lidnum; en sé blóðið þýtt og svart sem tjara, er skjaldan gagn að taka blóð. Aðgætandi er, að ef bólguhnútar koma útum froppinn, þá má ei ausa feldu vatni yfir flépnuna, heldur á að gæra flurdi í hnúta þessa, svo vefsinn, sem þar er, gæti útrunnid.

## 7 Kapítuli.

Um val, 'uppeldi og meðferð á Saudfénaði.

Maungvu ríður Íslendingum meira enn að vanda fé sitt, sjá til að það sé vel passað og af góðu kyni komid. Umsar tilraunir hafa verið gjordar til að bæta fjárrækt á Íslandi, en fáar af þeim hafa að gagni komid; var sú en seinasta, er Conferentsráð M. Stephensén gjordi, landinu lítið happadrjúg, og varla mun þessi að vænta, að fé úr eðrum heitari löndum gæti þrífist á Íslandi; hitt mundi langtum ráðleggra, að menn veldu vel úr því, sem til er í sjálfu landinu, því stór munur er á fé þar í ýmsum stöðum. Þannig mun enginn neita, að stór munur er á fénaði Húnvetninga og Flóamanna, því fé þeirra fyrri er annálæd fyrir stærð og gæði, hinna þarámóti er vesælt og lítið. Nú væri vísbúlega mikið undir því komid að sú hin betri tegundin, eg meina Húnvetninga fêð, breiddist útum landid, og mætti það eðrum hêredum til mikils gagns koma. Mest ríður á því, að fêð sé stórt, feitlagid og ullargott, og þetta þrennt mun Húnvetninga fé hafa til að bera framysir flest annað á Íslandi.

Dýralæknarar eru sambóma í því, að mikið sé komid undir því, að hrútar séu valdir einfa vel, en fênnimerki á góðum hrút eru þessi: hann á að vera

stór og vel varian, ennisbreiður, með stór og falleg eyru, hálsinn lágur og digur með fallegri ull, hryggurinn breiður, þroppurinn sivalur og lágur, fætturnir lágir og sterkir; ullin á að vera fin, mjúk og hvít, og aungva svartá eða mórauda bletti á hrúturinn að hafa, svo framarlega menn vilja hafa alhvítt fé. Eðli má hann vera eldri enn háls þriðja eða 3 ára.

Til að gæta þess heilsu á fé þína þessi kennimerki: ef fêð ber hefubid hátt, hefir falleg, opin og gladleg augu, þvalar nasir, þó án mikils slims; hafi það enga slæma lykt af munninum, hvíta og hreina tungu; ef fæturnir eru nettir og sterklegir, ullin vel fêst á fínninu, herundid fallegt, hvítt og kláðafritt, ef það etur vel og jórtrar, og fêu æðarnar í augunum raudar, þá má ætla að fêð fê hraust og heilbrygðt. Hafi fêð þarðmóti nokkra bletti á fínninu, fê ullin herð, þur og grá-gulleit; fê fíndin dauflæg og hengi hefubid niður í jerdina og þarhjá mjeg andfúl; fê tungan og tannkjötid bleikt, æðarnar í augunum bleikraudar eða gular, og grestur vellur útaf nösunum, sem lifist nasavilsu; þá er allt þetta óbyggjandi kennimerki þess, að fêð eðli fê frískt eða heilbrygðt.

Alður á fê þessist á þessum merkjum: á fyrsta ári eru þær 8 framtennur hvaðar, á öðru ári losna báðar framtennurnar, og í stað þeirra koma aðrar 2, sem hægt er að þessja á stærð þeirra og breidd: þá er fíndin 2gja ára. Á þriðja ári losna aptur 2 tenn-

ur, en það eru þær, sem standa 'við hliðina á þeim seinastnefndu, og í þeirra stað koma adrar breidari og stærri, og nú er kindin þrövetur. Á fjórða ári fellur sautkindin aptur 2 tennur, og koma þar aptur adrar 2 njar; þegar kindin hefir þannig 6 njar og breidar tennur, er hún 4ra vetra. Á 5ta ári losna þær 2 yfstu tennur, sem kallast hornmennurnar, og koma þar þá aptur 2 njar í þeirra stað; hafi kindin þá 8 breidar tennur, er hún fimmm vetra. Á 6ta eða sjeunda ári verða einum þær 2 fyrstu breidu tennur gul-ar, gamlar og brotna eða misást, þá þykir Dýra-læknurum mál að slátra kindinni, hvert heldur ær eða saudur er.

Það væri verdt fyrir bændur, þegar þeir á haustum slátra lombum sínum, að velja þau til lífs, sem væru stærst og ustarbezst, og hvorki selja edur farga á annann hátt; væri þá meiri von að úr þeim yrðu vænar stépnur; lífa er ei lítið undir því komid, að lomb eigi gott hiun fyrsta vetur, því það er ber-sýnilegt, að allar stépnur, sem sveltar eru í uppeldinu, verða ætíð minni og lakari, enn þær, sem hafa gott vidurværi. Reynslan er hér óhýgnust, því þeir bændur, sem hafa gésid vel lombum sínum, hafa ætíð átt betra, stærra og feitara fé, enn hinir, er dregid hafa vid þau födur eða illa farid med þau. Líka vardar það miklu, að lombum fé ekki offnemma stíad frá móðurmjólkinni; nokkrir stíla aldrei lombum sínum, og er það mál manna, að þau lomb verði bæði vænni og stærri enn önnur.

Það er að eðruleiti mjög nýtsamt, að lemb fái hinn fyrsta vetur gott hey, og svo mikid þaraf, að þau þrífist vel; grænt, smátt og velþurkad myrlendis hey er að öllu leiti betur þartil fallid enn tada, einkum sé húa miglud eða brunnin; þó má, þar sem ekki eru faung á góðu úthevi, gefa þeim tödu í úthevið stad, þegar hún er græn og velþurkad; sömu leidis á að vatna þeim á hverjum degi; það skadar ei og er enda betra, að láta þau ganga úti daglega, þegar bætilegt vður er, en fordælt verður að láta þau ganga á myrlendi, ef edru verður viðkomid, og hálendi er í nánd; líka er betra að hleypa þeim ekki út þegar hrímfröst liggur á jörðunni, fyrrenn hrímid er aftíð.

Salt er mikid höllt fyrir saudfénab, og er því einka gott að blanda dálitlu af salti í heyid vid og vid á veturnar.

Mikid r.ður á, að vanda vel fjárhús bæði handa lombum og fullordnu fé; einkum er mikid undir því komid, að þau séu flór og rúmgód, og standi heldur hátt enn lágt; gluggar eiga á þeim að vera, svo hitinn verði ekki ósmíttill, því haun er mikid skadlegur fyrir saudfé, einkum þegar því er beitt út á daginn. Fjárhús eiga að vera rúmgód, því annars þrífst saudfé langtum lafar.

Að endingu vil eg ráða öllum bændum til þess, að setja ei fleira fé á sig, enn þeir gæti haldið fram í hordum vetri, því þó útigangur reynist ástundum vel, þá er þó ei alltid á hann stólandi.

Eg veit, að flestast það, sem hér var nú talið, er flestum löndum mínum alþunnugt og liggur í augum uppi, en það er líka svo mikilsverdt og áridandi fyrir þá, sem vilja verða góðir fjármenn, að aldrei verður góð vísa ofóft kvæðin.

~~~~~

8 Kapítuli.

Um útvortis sjúkdóma á Saudfénadi.

§ 1.

Um Tóubít.

Öllum er það þunnugt, hvað áalðar vargur þessi drepur og risur fé til stórs skaða á Íslandi; eru sár þau, sem þaraf orsakast, óft ill viðgjærðar, þaræð þau annaðhvort eru framantí sképnunni edur á hálsinum; en hvort sem heldur er, þá á strax að taka þá dýrbitnu kind inni hús og athuga nákvæmlega hvort sárin séu græðandi; síðan þvo menn hid storkna blóð af, og bada sárin nóðrum sinnum daglega með fólðu vatni. Sé kindin holtrifin, einfanlega framantí brjóstinu, er sjalðan læfningar von. Blæði kindinni ákaflega, verður að bada sárin iduglega í edifi og vatni, ða álúni uppleystu í volgu vatni, unð blóðrásin stæð-

vast; lífa er einka gott að taka hégóma og láta of-
 ani sár, sem blæða; þegar blóðrásin er stöðvud, skal
 maður reyna að sameina sárid svo nákvæmlega, sem
 verður, leggja yfir það riur, sem dýft sé í olíu eða
 lýsi, edur og gjera sárasmyrslu af Ballhumli, sodnum
 í óseltubu nýu smjori, edur og Blóðrót, sem lífa
 má sjóða í nýu smjori, síðan smjerid volgt frá,
 og brúka sem smyrslu; smyrslum þessum á að rjóðra
 á línslaf eða mjúkar léreptsríur, og leggja í sárin,
 og skipta um einu sinni daglega, þar ástofan á að legg-
 ja bindi og búa vel um. Séu sárin mjög djúp og
 framaná barkanum, gétur það opt vel luckast að sauma
 þau saman, en þó verður að sjá um að kindin haldi
 hofdinu álútu, svo sárid yfist ei, þegar hún beygir
 það afturábak; heppnast það opt, með þessu móti
 að lækna sár á barkannm. Séu augun stöðvud
 á kindinni er ekki bata von, og er þá best að
 skera hana. Sár aptan á hálsinum eru minna stöð-
 væn enn þau, sem eru framaná eða á hliðunum, eink-
 um liggi þau djúpt, því þá eru optast nær stórar ædat
 særðar, svo sképnan deyir af blóðmissirnum. Sár
 framaná nesunum eða undir fjálkunum eru minna
 hættuleg, og læknaft opt, þó stór séu, en ætíð er þá
 samt nauðsyn að passa vel uppá kindina, og halda
 henni inni, meðan sárin gróa.

§ 2.

Um Bólgu í júvrinu (undirflog).

Það er almenn trú á Íslandi, að þegar ær fá

íllt í júvrid, þá komi það af því, að fljúgji undir þær, er þetta eignad titlingi þeim, er Steindepill heitir (*Motacilla oenanthe*); en eðlert er barnalegra enn hjátrú þessi, því hvað oft sem fugl þessi flýgi undir myllar ær, þá gétur það aldrei gjört þeim nokkud mein. Þitt er meining mín, að orsökinn sé sú, er Conferentsráð Stephensen umgétur, er hann segir svo:*) „við kvilla þenna verða menn skjaldan varir í hinum fyrsta mánuði eptir fráferuna, og næstum aldrei á árn, sem ganga með dílka; orsökinn til kvilla þessa held eg sé mjólkurkonanna hardleiki, þaræð þær tafa harðt á júvrinu, teima kindina á því innanum kvíarnar, og halda henni fastri á því, já ofani kaupid skella á júvrid með hnyttum hnefa, svo ærin betur mjólkfi.“ Hver, sem hefir séð þessa vitlausu og mißunarlausu meðferð á mjólkurkindum á Íslandi, og einkum ef hann þeckir litid eitt til júvursins legunar og byggingar, hann mun bráðum sanufæraft um það, að það sé engin furða þó ær oft sái íllt í júvrid af þv lífri meðferð, sem, því midur! ei er svo skjaldgæf; því vil eg ráða öllum bændum, ef ær þeirra fá kvilla þenna, að þeir alvarlega advari mjálta-konur sínar, við ádur-nefndri hraflægri aðferð, og gefi sj lífir nákvæmlega gaum að, að áminningum þeirra sé hlýðt, og munu þeir þá verða fríir fyrir að fljúgji undir ær þeirra. En beri svo við, að kvilli þessi komi, þá á

*) Sjá Veterinaire-Selskabets Skrifter. 1 Deel, Pag. 208 og 209.

strax, sem merkið til bólgunnar, að mafa hana með smyrslum, sem búin séu til að jofnum þertum af Saurberja-olíu og Althea-smyrslum; séu ei smyrsl þessi að fá, má í þeirra stað tilbúa ennur á þann hátt, að teknir séu Jakobs-físlar (*Erigeron alpinum*) og fodnir í nýju óseltudu smjori; síðan er smjorid síð frá áðurenn það storknar; eru þetta einka góð smyrsl til að græða bólgu í jóvrunu.

§ 3.

Um Kláða á Saudfénadi.

Kláði kemur af þrífum og flæmum atbúnadi, skemmdu og mjög migludu heyi, óhreinum, lágum og ofheitum fjárhúsum; er hann opt flæmur víðfángs, þaræð sképnur, sem hafa hann, þrífast aldrei vel, og hver kindin fær hann af annari. Best er því, strax sem vart verður við eværdargéist þenna á einhverri kind, að taka hana strax frá þeim heilbrygdu, láta hana í hreint útihús, þvo hana vel í feytu eða sápuvatni, ef faung eru á, og mafa alla þá stadi, hvar kládinn er, með grænni Sápu, eða áburdi, tilbúnum af óseltudu nýju smjori og Brennisteins-dupti. Náðsýnlegt er að klippa ullina noðud burt af þeim stæðum, hvar mestur er kládinn, svo áburðurinn geti nuggast inni húðina. Allar þær kindur, sem kládann fá, eiga að meðhendlast þannig, sem nú var sagt; en sé vor- eða sumar-tími, þá er gott þarabauki að fund-

leggja fé i sjó, og á þartil að velja göðann og blid-
ann sumardag.

§ 4.

Um Lús á Saudfénadi.

Það veldur oft óþrifum á lómbum og úngfé,
er þau stríða kvif af lús; er það einfum á mögrum
og vesælum kindum að ófénadur þessi safnast að. Til
að fyrirbyggja þetta er það besta ráð, að búa vel að
fénu, halda lambhúsum hreinum, en þó ei mjög heit-
um, sundleggja lömbin í sjó i góðu vedri, edur og
þvo þeim upp úr stærri keytu, volgum sjó eda
föstu vatni; líka verður að gefa þeim hið besta
hey, því annars dragast þau upp úr uppdráttar
óþrifum.

§ 5.

Um Beinbrot.

Þegar kindur fá beinbrot, varðar miklu hvada
bein brotið er, því sum beinin gróa fljótt og af sjálfu
fér; þannig er því varid með risbeinsbrot, að þau
gróa oft saman án þess madur verði við. Berra
er þegar fót- eda lær-leggur brotnar, því þá kostar
það mikil ómak að lækna kindina, og verður ástund-
um, þar sem eigi eru góð áhold eda faung til þess,
bógt eda ómögulegt; betra er því strax í tíma að

stóra kindina, áður enn hún missir bæði öll hold og hamfa.

~~~~~

## 9 Kapítuli.

Um innvortis sjúkdóma á Gaudfénabi.

### § 1.

Um Höfudsótt (Kingsyge).

Þegar kindur fara einfara, hama undir flettum, eða við ár og gil, þar sem fossnidur er, halla undir flatt, 'og bita ekki nema með tölum, þá hafa þær Höfudsótt. Þessi þessi kemur afulli, sem sinnst í heilinum; má hana með því lækna, að bora gat á höfudid með þartil gjörðum bor (Trepan), þetta kallast að trepanera, en ekki er það annara meðferð, enn Dýralæknara, ef að lagi á að fara. Eg vil því ráða lendum mínum strax að stóra höfudsóttar kindur, því allar aðrar lækninga tilraunir, enn þær nú teldu, eru ónýt.

Kindur fá stundum kvilla, er lifist Höfudsótt, af því, að smá kvikindi, einkum á sumardag, safnast fyrir í nesum þeirra, svo nasirnar belgna og verða raudar; lækna má þetta með því að sprauta olu inni

nasaholurnar. Noðrir halda að Hefubótt gangi í erfdir; sonnu á því veit eg ekki, en eigi er það með öllu líflegt; sé þetta satt, ætti að varast að ala upp lemb eða hrúta undan heim fiðum.

## § 2.

### Um Búðlaup og Blóðsött.

Magurt fé, sem lengi hefir gengid úti, og einsum hefir lifað af gömlu og stémmdu heyi, fær oft kvilla þenna, þegar vora fer, í gróandanum; deyir þá sumstadar fjeldi fjár af kvilla þessum og verður ei aðgjort. Þurfud Bláber eru einka gott meðal við kvilla þessum, og verða þau að geymast vel og vandlega á vetrum, ef til þess skulu duga; má taka af þeim handfylli og láta í heyr þad, er kindin á að jeta. Eika má seyði gjöra af Blóðrót eða Sortulyngi, og gefa kindinni þaraf nokkra matspæni, þartil Búðlaupid stöðvast. Best er að beita fé því, sem hefir kvilla þenna, á hæðum eða fjalllendi, en láta það ei ganga á mýrum eða votlendi, verði því viðfornid. Lemb, sem hafa sjúkdóm þenna, má og lækna með því, að gefa þeim ádurtafid seyði, eða þá litid eitt af mulinni frít í vatni.

## § 3.

### Um Orma.

Fé, sem er magurt og hefir lifað af slæmu heyi,

fær opt orma, þrífst það há eðli, og dregst þannig opt upp; þetta gétur líka ept komid af því, ef kindur drekka af mýrlendis eda serarpollum. Sid bezt med al móti þessu, er ad taka 4 lód af edli, 1 lód af salti og litid eitt af vatni, og gefa þetta inn einu sinni á dag, i. 6 eda 8 daga.

#### § 4.

Um Tjgðrdar-bólgu í Geilanum (Sjernebetændelse).

Beiki þessi kেমur helst á sumardag i megunum sólarhita, og mun hún þi skjaldgæf á Íslandi. Hénar helztu kénninger eru þessi: kindin stendur og hamir og hengir hofudid nidur; ennid og eyrun eru áfaslega heit; augun eru aptur og renna í vatni; munnurinn er heitur og þurr, og tungan þakin med hvítu slími; sumar kindur fá skjálsta og hristast einss- og hrista í flogi; adrar ráfa umkring med ringli, unð þær detta nidur. Strax og þessi merki sjást, á ad taka kindinni bléd, og láta blæda toluverdt, sidan á ad gefa henni inn 1 quintin af Saltþéttri, uppleystum í vatni, 3þvar sinnum daglega.

#### § 5.

Um Bráddauda á Lómbum.

Þad er ei skjaldgæft ad únglemb hrinji nidur á vordag, fyrirrenn þau komast toluverdt á fót; eru mest bregd ad því í feldu vedri og auðan-næðingum

eda hreggvidrum, krókna þá morg af þessum ný-  
 bornu aumingjum þí, er þau fæðast á nóttunni.  
 Héradauki er almennur lamba sjúkdómur á Íslandi,  
 er kallast Flog, og verður hann mörgum að bana,  
 er það ei annað enn dauðligar sinatengjur, sem lómb-  
 in fáallti einu, og detta þau þá um koll stundum dauð  
 í sama augnabliki. Kvilli þessi er líkur sjúkdómi þeim  
 á bornum, er Gínklofi kallast, því hófudid og háls-  
 inn reigist apturábað með ófalegum tengjum, uns  
 lömbin deya, ástundum eptir miklar kvalir. Flest  
 lömb, er eg hefi séð deya úr þessum flogum, voru  
 feit og stæðileg, og fengu veifina allt í einu að falla  
 mátti; höfudust þau ástundum svo hátt í lopt upp  
 að furdu gegndi, og duttu þá oft dauð niður; en  
 stundum urðu þau stíf, sem tré eda staur, og dóu  
 eptir lánga þjáningu; höftist eg þá sjá, að kvillinn  
 er af sama uppruna sem Gínklofinn, og verður að  
 brúka við hann öll hin sömu meðel; gétur þá skýð  
 þau hjálpi ástundum. Á einu lambi, sem eg reyndi  
 Dplum, sá eg stóra linun á sjúkdóminum, og öðrum  
 batnadi eldúngis eptir teluverdt stóran skamt, af Dp-  
 iumð-dropum, nefnli. 5 eda 10 dropa hvern hálfann  
 flúðutíma. Það er gamalt ráð, að skera rófuna af  
 lömbum þeim, er fá kvilla þenna, og láta blæða telu-  
 verdt, er ei ólíklegt, að það, sem mörg ennur húss-  
 meðel, sé byggt á gamallri reynslu, og hafi mátté  
 stundum að gagni komid; eg reyndi það og á einu  
 lambi strar í byrjun kvillans, og linadi því samstundis  
 þarvið, þó vöru hin fleiri er dóu, mátté af því það

var gjört offeint, Adferð þessi er og öldungis sam-  
hljóða læfningarmáta nýari læfnara á Ginklofa, sem  
halda að hann komi af bólgu í mænunni, og taka því  
blód í meira lagi; væri því ei ólíklegt að blódmisfir-  
inn, sem kemur þegar rófan er afftorin, hafi sömu  
verfun sem blódtakan; en þó mun þetta ráð, sem öll  
önnur í þessum kvilla, eðli þriggult vera, en ei er  
ólíklegt, að það optar hjálpadi, ef menn, ásamt því,  
gæfu inn Dplums-dropa, einsog áður er sagt, edur og  
settu lambid niður í volgt vatn,

## § 6.

## Um Lúngnaveiki.

Veiki þessi byrjar optast nær með hósta og  
hriglu, þó er hóstinn ástundum lítil; kindin er ákaf-  
lega mædin, heldst ei við hold og horast niður; þegar  
kindinni er slátradr, eru bæði lúngu og lifur optast full  
af smáum, herdum brislum eða hnútum, og sést þá  
opt til graftar í þeim. Það er ei skjaldgæst, að  
lúngar kindur fá kvilla þenna, og er þá ei til neins að  
láta þær lifa lengi, þar kvilli þessi er með öllu ó-  
læknandi; það er því ráðlegt fyrir bændur í tíma að  
slátra kindum þeim, er líkindi eru til, af ádurtef-  
um kénimerkjum, að brjóstveifar séu, því annars  
dragast þær upp, og verða svo að lokunum sjálf-  
daubar.

## § 7.

## Um Bráddauga á Saudfénadi\*)

Bráddaugi kallast almennt sjúkdémur sá, er allt í einu verður findum að bana. Tilfæni og aðferð sjúkdóms þessa er hmisleg og margbreytt; en optast

\*) Árið 1833 var Dýralæknari Teitur Finnboðason sendur af Sipt-áttmanni Rieger til að grenslast eptir Hjár-bráddaugum á Austurlandi; fór hann í þeirri ferð um Aknes og Ríngáravalla-sýslur, en varð, því miður! ekki svo mikil ágengt, sem skyldi, því það var um þann tíma að Bráðdugi á fé er Hjarðæfur, nefnilega í Júlí mánuði. Hann reyndi samt sem áður að komast eptir orsökum Hjárþýkionar, og gjörði einkum náðæmlega tilraunir með gras það, er almennt kallast Síkinga-gras, (*Narheticum calyculatum*, Hialla = bjarnarbroddur). Gras þetta meintu bandur í nefndum síslum að væri eitrad fyrir fé, og gæfi tilfæni til Bráðdaugans; drógu þeir það af því, að féð etur ei gras það, nema mjög hungur; en eptir háns tilraunum virðist það ei svo, því alls ekkert var að sjá á kind þeirri, er hann lét jeta töluvert af tæðu grasi. Hann hefir þessvegna, í síðustu þeirri, er hann hefir samid um Hjárþót þessa, og sem sama ár var sendt til Mentakamvefisins, gætið þess, að gras þetta eigi gæti verið orsök til tæðrar veikis á kindum, en jatar jöfnstæmt, að kindur ekki jeta það, sökum þeirra smábrodda, er á því finnast. Hann álistur því tæðann Bráddauga á fénu einkum vera innifalinn í 3 veikindum, sem eru: 1) Upphempa eða Vindveiki, 2) Vatnesfótt, og 3) neðurskonar Bráddaugi (Þest).



er þ: hofud=einkennið, að brátt verður um ftepnuna. Almenníngi, sem ei hefir eptir öðru að gánga, enn því, sem mest aðfædur, verður það því á, að falla marga ýmislega sjúkdóma á kindum, -er bráðdaudar verða, með þessu sameiginlega nafni.

Eptir ætlan minni eru einkum fimm tegundir af Bráðdauda: hin 1ta er sú, er mest er algeng við sjáfar-síðu, og hana vil eg kalla Fjoru-Bráðdauda; hin önnur er illertud umgángsfykti, er Dýralæknarar almennt kalla Miltbrand (Miltis-bráðdaudi); sú 3ja er illertud Lúgnabólga; sú 4da er Windveiki eða Upphemba, og sú 5ta er Fjárbóla. En til þess, að löndum mínum verði þetta auðfildara, þá vil eg hér nákvæmar tala um ferhverja tegund þessa útaf fyrir sig, og hvornig þær verða fyrirbyggðar og læknaðar.

A. Fjoru-Bráðdaudi er almennur við sjáfar-síðu, og í eyrum, þar sem fæð lifir mikið á fjerunni, og etur ýmsar þángtegundir. Kindin verður alit í einu sem heltekin, þettur daud nidur, edur stjegrar stundum áður litid eitt á ýmsar hlíðar; kroppurinn verður bláleitur, rotnar mikið fljótt og lyktar ákaflega illa, svo að hverki hundar né hræðyr hreifa við henum. Það er mál manna, að bráðdaudi þessi sé algengastur frá September mánuði til Janúarís mánaðar.\*) Mennt halda að sjúkdómur þessi komi af því, að fæð jafi

---

\*) Sjá Veterinair-Selskabet's Skrifter 1 Deel, Pag. 210.

eiturpeddu ofani sig með þáginu, en enginn hefir sæð hana, eda veit meiri grein að gjöra fyrir því, Aðrir geta til, að innanum nokkrar þángtegundir, sem saudfæð jetur, séu eitradir sjóar-vextir, og er sú tilgáta, að minni hyggju, eigi ófannshnileg, og ómáksins væri verdt, að tilraunir væru gerðar með fleiri þángtegundir, sem vaxa á Íslandi, af hvorjum þær helztu eru þessar:

- 1) Klóþáang eda Bólupáang (*Fucus vesciculosus*).
- 2) Þyðvapáang, Æti-þáang (*Fucus nodosus*).
- 3) Bledrupáang (*F. divaricatus*).
- 4) Rabbapáang (*F. serratus*).
- 5) Þrossapaungull (*F. digitatus*).
- 6) Mariu-fjarni (*F. esculentus*).
- 7) Sol (*F. palmatus*).
- 8) Sauda-þari (*F. ovinus*).
- 9) Sætíþari (*F. saccharinus*).
- 10) Selvamædur (*F. ciliatus*).
- 11) Öðustélja-þáang (*F. lycopodialis*).
- 12) Fjoru-far (*F. aculeatus*).
- 13) Litli þari (*F. elisticus*).
- 14) Bængja-þari (*F. alatus*).
- 15) Hvíti þari (*F. albus*).
- 16) Raudi þari (*F. sanguineus*).
- 17) Sveppa-þari (*F. fungularis*).
- 18) Dún-þari (*F. plumosus*).
- 19) Grái þari (*F. foenicularis*).
- 20) Ullar-þari (*F. laneus*).
- 21) Þuska-stégg (*F. corneus*).

Allar þessar þara-tegundir vara í fjöru og á stærjum á Íslandi, og þó jetur fêð allramest. Rabba-þarann, Veti-þángid, Bölú-þángid, Solin og Solvamæðurnar; en það er ei ólíklegt að sumar af þeim fyrirtöldu tegundum gæti verðad sem eitur, einkum ef saudfé jetur miðid af þeim; í það minnsta er það almennt, að kindur þær, er jeta miðid af Veti-þangi, fáí opt innantökur og megna sótta. Það væri ómakksins verdt að reyna allar þær umgétu þáng-tegundir á saudfé, og gætu menn þá gengid úr flugga um hvert nöðr-ar eða hverjar af þeim væru eitradar, og yrðu menn þá að sjá til að fêð gengi ei á þeim stærjum, hvar slíkir eitur-þarar yru, hvað ed væri það beztu ráð til að fyrirbyggja þenna bráðdauda, því svo deyri kindin fljótt, að öldungis ómogulegt er öðrum meðelum við að tóma, enn einungis því, að fyrirbyggja tilefni það, er orsakar bráðdauda þenna.

B. Miltis = bráðdaudi (Miltbrand). Þessi þessi er brád og stríð Igjörðarsótt, er innan flammis orsakar fljótann haldsúa og rotnun (Kolbrand), svo dauda-sár detta á flépnuna allopt bæði utan og innan, þó er það almennast, að sár þessi finnast í þermunum, lúgunum, lifrinni eða miltinu, af hverju sjúkdómurinn í endverdu líflega þesir fengið nafn sitt. Þau helztu kénimerki hans eru þessi: kindin jarmar aumfunarlega eða stynur þángann, kastar sér nidur, en stendur þó upp optur, krapsar með fótunum í jerdina og eingíft saman, dettur svo

nibur með hordum sinateggjum og deyr allt í einu með froduna í munninum; opt varir þetta mikil stutta stund, en stundum gæta þó líðid 3, 5, 7 edur fleiri dagar, áður enn kindin deyr. Það ber opt við í edrum lendum, að veifi þessi er algengust í heitum og þurrum sumrum, þegar vatnið þornar upp, svo kindur gæta ei fengid annað enn lítið og flæmt vatn. Á Íslandi er hún þar á móti, eptir því sem eg veit, algengust á veturnar. Umsfar aðrar orsakir eru talðar til hennar, svo sem lélegt fóður, illa þurkad og flæði-hey, ehóllt lopt í fjárhúsum, nockrar grastegundir þegar þær frjósa, og sálft sóttnæmi veikleikans, sem gjörir það að verkum, að hver kindin gétur fengid hann af annari; eðfi mun þess heldur að dylja, að hann mun verri vera á láglendi og mýrlendi, enn þar sem dregur til fjalls; semuleiðis mun hann stjaldgæfari þar sem skógar eru. Það er trúi sumra á Íslandi, að saufé fái drepsótt þessa af grasi því, er menn kalla Fjárbana, og vara á, eptir sögusögn sumra, í mýrlendis súaféldum, en hverki hafi eg fundid þessa gétid í Grasafræðum vorum, né gétad fundid það eptir tilfögn annara, sem líka hafa lýst því mjög hmiðlega. Í vestur-eyum víssa eg að sumir kældu gras það, er annars almennt kallast Skattartunga (Plantago maritima) þessu nafni, og vildu sumir eigna því bráðdauda þann á fé, er þar var algengur; en alltadeinu einsog gras þetta er langt frá að vera eitrad, eins álit eg tilgátturnar um þenna svofallada Fjárbana á engu bygðar.

Ymisleg ráð eru brúfud til að umflýja veikni þessa, svo sem: að tjarga saudfé, brenna brennisteini í fjárhúsum, en öll eru þau ónóg og hjálpa eldúngið ekkert optast; þannig víssa eg sumu tjarga fé sitt fram-  
ani með krossmarki; aðrir brendu tjöru, einir eda þessháttar í fjárhúsunum, og kom það, sem von var, ekki að neinu gagni, svo eg víssi.

Ekki er því að leynd, að fyrirbyggja mun mega opt að noðruleiti veikni þessa, og stéður það best með því að burtrýma áður nefndum tilefnum hennar, (og mun það best lánast að minni hyggju á þenna hátt: 1) Sérhver bóndi skal vanda fjárhús sín, og rður einkum mest á að því sé fylgt, þar sem veikni þessi er mest algeng; einkum rður á að fjárhúsin séu rúmgóð, standi hátt, helzt á hólum eda hærðum, hvar því verður viðkomid; ómissandi væri og að hafa vindaugu eda stromp á fjárhúsunum, svo loptid gæti haldið hreint og gott; halda skal þeim og sjálfum vel hreins-  
um, og umfram allt verður að sjá um að þau ekki lefi. 2) Hvern dag, þegar gott veður er, skulu fjárhúsin standa opin, svo loptid gæti um þau blásið, því annars er hætt við að í þeim safnist óhollir dampar. 3) Fénu á að vatna þar sem hreint og gott vatn er, og má smali ei líða, að kindurnar, þegar hann stendur yfir þeim, dregi af óhreinum læfjum eda forugum mýrarpollum; eg veit af eigin reynslu, að saudfé þessir fengið héruefnadann sjúkdóm af þessu, og dáið eptir stuttann tíma. 4) Þar sem veikni þessi er algeng, á að beita fé svomitid sem verður á fjallendi, eda sé

það eigi nálegt, þá þar sem eru hólur eða holt, og varna því að ganga mjög á myrlendi, einkum þar, sem smáslóar eru. 5) Halda á fenu hreinu og þuru að svo miklu leiti sem mögulegt er. Eftirráð Wísborg ræður til\*) að ausa koldu vatni yfir fêð, og sundleggja það, þar sem þessi kvilli gengur. Sá sami ræður og til að taka feitum kindum blóð, setja á þær hánka, og mun ráð þetta að visu gott, en bággt mun því. við að koma, þar sem fjöldi saubfinar er. 6) Hafi veifi þessi látið sig í ljósi á fenu, þá er að óttast, að hver kindin fái hana af annari, og er þá mikils stada von; þessvegna skal strax taka þær veifu kindur og hafa í húsi útaf fyrir sig; semuleiðis á smali að sjá til, að ei komi fê hans saman við annað fê, hvar sóttin gengur. 7) Hafi drepstótt þessi tekið aðsetur sitt á nokkrum bæ, svo að hver kindin fái hana af annari, þá á að renkja í fjárháfunum með heim svokallada Klór-renk (Saltshru-renk); stædur það á þenna hátt: að taka á 2 parta af salti, og 1 part af Brúnnsteinsdupti og hella þarí sterftri Brenni-  
steins-shru,\*\*) þetta á að streka optar, en verður að

---

\*) Sjá Eftirráð Wísborgs Afhandling om Miltbrand og Dvægshje.

\*\*) Dupt þetta, ásamt Brenniusteinsshrunni, er hægt að fá á Apothekum eða hjá Fjórðungslæknurum, kallast það almennt Pulvis ad fumigationes muriaticas, og er einfalt gott til að eyða þannvænum drepstóttar dampum; þannveg brúlast það í Rólera og öðrum þannvænum

sjá til að reykurinn sé úr fjárhúsunum áður enn fæð er innlátid, líka er varúðarverðt, að reykurinn sé ei sterkari enn svo, að vel megi þola, því annars er þeim, sem þetta verk gjerir, sjálfum flæði búinn. 8) Eðli væri af vegi að kinnu við og við Einir-hrisslum í fjárhúsum, þar sem annaðhvort þessi eða aðrar föttir ganga.

Kindur þær, sem veikar verða, á að meðfara sem nú segir: taka á þeim blóð, sem feitar eru, sem þezt flæður þannig, að dálstid sé tekið aptanaf rófunni þartil ánægjanlega hefir blæðt; strax á líka að setja hánka á siduna, samt ausa vatni yfir kindina 2svar eða 3svar sinnum daglega; eðli þarf neinn að öttast að gjöra þetta þó kindin stjálfi, því hún hefir engu að síður gott af að badað í fældu vatni; þó, ef svo ber við, að merkist til smáþrimla á kroppnum, þá má kindin eigi badað, því annars fer sjúkdómur frumefnid úr fyrstlunum inni flæpnuna aptur. Sé kindin mogur, á að gefa henni seyði af víðirberki, Reinir-berki eða Hrisberki, blandad með dálitlu af edifi eða góðri sýru og brennivíni, sem hefir stadið á Hvannarótum.\*) Þarinnú kindinni vefnandi, má reyna

---

sjúkdómum og kímur opt að miklu gagni. Þetta er og vandalaust að gjöra, því eigi þarf annad enn láta áður umtalad bupt á talerki eða í skál, og svo láta Brennisteins sýruna brjúpa til í dropatali.

\*) Tak víðirberki 2 lóð, stjób svo í 3 mörkum af vatni hízumbil fjórða part flúðustundar, síá síðan seyðid frá og

ad taka blóð, og fara svo fram, sem nú var sagt. Eðfi væri heldur af vegi ad setja kindinni stólpípu af mjólsúpu, bræddu smjóri og dálitlu af salti. Vilji kindin drekka, á ad gefa henni vatn, í hverju sé hrært dálítid af súrdeigi og blandad med nockru af salti, sem svari hérumbil einni handfylli í vatnsfötu. Stundum ber það við, þegar kindinni fer ad batna, ad útum hana koma graftarfylli, skal þá á þeim þinga, og sjá vel um ad vogurinn óhindrad geti útrunnid.\*) Rohlweß, sem álitur mikid undir því komid, ad kindin fái nóg ad drekka, rædur ad láta fulla vatnsfötu, hvori séu látnar 2 handfyllir af salti, standa hjá stépnanni, sem veif er. Hann rædur líka ad gefa Saltpétur 1 eda hálfstannad lóð, uppleyst í 2 merkum vatns, og þaraf gefist kindinni 2 matspæni nockrum sinnum daglega. Þaradauki álta allir Dýralæknarar það einka gott ráð í sjúkdómi þessum, ad kindin sé haunkud eda í hana settar baunir.

C. Lún'gnabólga er hin 3ja veif, er menn ástundum nefna Bráddauba á Íslandi, kemur það af því, ad sjúkdómur þessi verður ástundum svo algengur, ad margar kindur fá hann allt í einu, og deya þá sumar af þeim ópt snogglega, fylgir honum þá

---

blanda þari 3 matspónum af edli og 4 matspónum af Hvannarótar-brennivísi; af þessu seybi á ad gefa kindinni 2 matspæni nockrum sinnum daglega.

\*) Sjá Etatsråd Wibergs Afhandling om Miltbrand-og Dvæghyge, Kbh. 1821.



opt illa kynjud magnleysis Kolbu-veifi (sem almennt kallast af Dýralæknurum asthenísk Feber). Einkenni sjúkdóms þessa eru: kindin hefir hósta, hryglu, og er mjög mædin þá hún gengur, hún vill ei bíta eða jeta ef innistendur, en þyrstir mjög, hjartad slær harðt og tídt og kindin er óröleg, andardrátturinn er þúngur og fljótur. Þrennt er til um endahykt veikleika þessa, sem er: 1) Ad kindinni batnar smátt og smátt af sjálfri sér, 2) eður og ad úr því verður lángrandi brjóstþýfi, svo kindin er simögur og dregst smátt og smátt upp, ella og 3) ad hún deyri snogglega. Ymsar eru orsakir til veikleika þessa, svo sem votvidri og óskodug vedurátta á haustum og vetrardag, súgur í sjárhúsum, sem annars eru troðfull af saudfénadi, sagga- og vætusfull sjárhús, miglab hey, slæmt vatn. Afíðkomulag loptfins, sem orsakað gétur kvilla þenna á saudfénadi, er almennast á vor eða haustdag. Kindur þær, sem fá veifi þessa, eru optast nær hinar feitustu og vænligustu, og er hún þeim líka ástundum hvað hættulegust; þeim á strax ad taka blód, þegar til veikleikans merktist, og láta blæða í frekara lagi; líka ridur mjög á því, ad kindin hafi nóg ad drekka, því optast þyrstir hana mjög, en adgæta verður þá, ad druckurinn má ei kaldur vera, heldur skal úr honum tekið kalsakulid, og láta á í hann dálitlu af Saltþéttri, hérumbil 2 lóð í eina vatnsfötu; setja á stólpípu með mjölsápu, bræddu smjóri og dálitlu af salti. Sé kindin mjög magnlitol, má gefa henni fáeina Hoffmannsdropa eða Hvannarótar-brennivín; en

þyngist mjög um andardráttinn á aftur að taka blód, einka gott er lífa að hánka kindina á bringuföllum á einum eða fleiri stöðum. Dragist veifi þessi í langt drag, þá er stjaldan bata von, því þá grefur í lúgunum, og þá er bandum ráðlegt að slátra slépnunni. Gæti maður komist fyrir orsakir fjúkdómsins, verður að svo miklu leiti sem mögulegt er að koma í veg fyrir þær.

D. Uppþemba eða Windveifi (Trommesyge) er hin 4da tegund er orsaka kann Bráðdauda á saudfénadi. Veifi þessi kemur þaraf, að fæðjetur ofmikit af megnu sterku heyi, svo gangur kemur í garnirnar, kindin upphembist þá, og deyir innan stamms, ef henni ei er hjálpad. Menn eru vanir að hjálpa kindum þeim, er hafa veifi þessa, þannig: að maður gefur þeim inn nokkrar theskeidar, eða sem svari litlu spénbladi af Hvannarótar-brennivíni nokkrum sinnum daglega. Dýralæknarar gefa 2 quintin af Steinolíu í 2 matspónum af brennivíni, og hjálpi það ekki, stinga þeir á kindinni með mjóum bor, (um hvorn áður er talad, og hvors lögun fæst á meðfylgjandi töflu aptan við bæfling þenna); það gjerist á þann hátt, að maður flippir ullina vandlega burt í náranum á vinstri síðu, og stingur síðan bornum inn nokkrum fingurs-breiddum frá mjedminni, á líkann hátt og áður er umgétid við Uppþemba á nautpeningi. Borinn skal vera álífa lagadur og gétid er um að framan, álífa digur og pípuleggur, og hérumbil 3 þumlungar á lengd.

E. Fjörðbóla eður Spanská pestin. A medal hinna verstu sjúkdóma, sem nockurntíma hafa látið sig í ljósi á Íslandi, má án efa telja þá svo nefndu sponstu fjárdrepsótt, sem árið 1761 kom með þeim sponstu hrútum, sem bata áttu fjárræktina. Hún byrjadi fyrst á Sudurlandi, en færðist síðan smátt og smátt uppi Borgarfjörðinn, og víðar. Í ferðabók Vice-Lögmanns Eggerts Dlafssonar og Landphysici Bjarna Pálssonar er talad um hana á þessa leið:\*) „Veikin byrjadi á Sudurlandi og hefir nú útbreiddst svo mjög, að óttaft má fyrir, að fé almennt útdeyi; veikin byrjar með viðbjóðslegum kláða um allann floppinn, ullin dettur af fénu, og raudir blettir sjást á horundinu; þetta byrjar fyrst í nárunum og aptantil við rófubeinið og á hálsinum, með óþóanlegum kláða fyrir flépnuna; flinnid verður þyct og hleypur saman í hruckur; kindurnar verða meir og meir magnlausar, og deya að lokunum; fáeinum kindum, sem halðid var inni og smurðar vóru með háfallslýsi, fúru smjori og edru þessháttar, batnadi að lokunum eptir lágann tíma; Landphysicus Bjarni, sem nákvæmlega ransakadi veikina, héldt að hún kæmi af litlum ormi, sem hann fann í horundinu umkringj hársræturnar. Drmur þessi var hvítur, gagnsær og svo litill að ei mátti sjá hann með berum augum. Þegar þeim veiknu kindum var slátradi í tíma, þá var tjetid óflémmnt að sjá, og var

---

\*) Pag. 979

hvorki lyttar né smeck-flæmt, ekki heldur varð það neinum að skada, sem bordaði það." Þegar þessi vonda veifi hafði gengið nokkur ár og gjört óbætanlegann skada, útkom lofsins árið 1772 konungleg skipan, sem bauð að slátra illum heim veifu kindum, hvarvið veifinni lofsins slóðaði 1779\*). Þetta er nærfeldt allt, sem eg hefi gétad fundið skræð um veifi þessa, og er það mikil furða, að hvorki hinir lærðu menn á þeirri öld hafa eptir sig látið gleggvari frásögn um hana, né að Conferentsráð M. Stephensen sál. ekki nefnir hana í ritgjörð sinni um veifindi á Saudfénabi á Íslandi.\*\*)

Af ádurteöldum ritum um veifi þessa er ei hægt að sjá, hverskyns hún hefir verið, þó þykir mér líklegast að það muni Þjárbóla verið hafa, því að það hafi verið kláði, finnst mér ólíklegt, þaræð veifin var svo bannvæn, og því vil eg hér að eins tala stefar um Þjárbóluna, þaræð hæglega gæti stæð, að hún í annað skipti sýndi sig, og mættu þá eptirfylgjandi ráð vel að gagni koma.

Þjárbóla (Gaarekopper) er mjög sóttnæm veifi og þaradaufi mikid hættuleg, ef hún er látin sjálfráð, hún útbreiddist þá optast mikid fljótt og hlífir augnum, nema einungis heim kindum, er hana hafa haft áður. Kennimerki hennar eru þessi: fæð hættir að jeta, en þyrstir mjög, það jóttrar ei, augun verða

\*) Sjá Eptirmæli 18du aldar, bls. 516.

\*\*) Sjá Veterinair-Selskabsets Skrifter, pag. 206.

bólgin, raud og fljóta í vatni; útar nesunum rennur þyctt, hvítt slím, sem stundum er gult; eyrun verða fald; það hengir höfudid niður og stendur í fúðung og krókir; raudir nabbar sjást lífa á hörundinu, sem verða að bólum, koma þá stundum stírar skellur af þeim og grósturinn klístrar hárin saman, ullin dettur þá optast af, hvar bólnarnar hafa setid, en kroppurinn og höfudid bólgnar upp, stundum verður sképnan blind og deyr opt að 8 dögum lídnum, en stundum eptir lengri tíma. Það ébrigdulasta og besta ráð við veikni þessari er bólusetningin.\*) Hún er gjörleg á hverjum tíma árs sem vera skal, en best er að gjera hana sem fyrst, áðurenn veikin hefir útbreidt sig, í góðu og ei mjög feldu vedri. Umsir stadir á sképnunni hafa verid valdir til bólusetningar, t. d. innan-til í eyranu, aptan undir réfunni eða framantil undir bægnum, hvar minnst er ullin. Adferdin við þetta verk er nærfeldt hin sama og við Kúabólu-setning á manneskjunum. Til bólusetningar brúfast vefsi sá, sem tekinn er af kindum hinn 11ta eða 13da dag eptir að þær urdu veikar. Málin, sem þartil brúfast, á að vera 2 þumlunga laung, hálfss. þumlungs breid, oddhvosss og beitt, og lítið hol í annari þlid út til oddsins; skaptid á henni á að vera fjórdungur þuml-

---

\*) Møhlver segir, að varla hafi dáið 1 kind af þúsund fjár, er hann setti bólu. Hvílikur skabi var það þá ei, að Zeslenbingar ei vissu þetta ráð, þegar sú spansta fjárpest geisadi hjá þeim?

úngs á þyðt, 3gja þumllinga langt og sívalt, og er bezt að bólusetjarrinn hafi fleiri enn eina í tafinu. Mál þessi finnast afmálud á fopartöblu þeirri, er finnast aptanvið bæfling þenna.

Kindur þær, er bóluskalet setja, leggjast á bord eða fjet, til hægðar fyrir bólusetjarann; kindin, sem bóluefnid er tekið af, liggi á hina hægri hlið bólusetjarans, og sé hún bundin; síðan tekur bólusetjarrinn nálin, heldur henni á lífann hátt og skrifarapenna, stíngur oddi hennar í bóluna, hvar bóluefsinn er hreinn og skær, hallar henni svo nockud uppá við, svo að vesinn renni um hinn hola flöt nálarinnar, og síðan stíngur hann oddinum hægt á ská inni skinnid, þó eigi þýpra enn að sjá megi odd hennar; þegar nálin er komin svo langt inn, að sú holi flötur er inni, á hún að snúast um, svo að hann snúi niðurávið að holdinu, og þegar nálin dregst út aptur, þá leggur bólusetjarrinn hinn vinsttra þumalsfingur ofaná odd nálarinnar, svo bóluefnid ei renni út aptur; þegar þessa er gætt, þá er rétt sett bólan.\*)

Þeð, sem er bólusett, látist í annað hús unð lof-  
id er bólusetningu; að 10 eða 11 degum líðnum frá því bólan var sett, á það bólusetta sé að skoðast, og það, sem bólan ei hefir komið út á, eða eðfi hefir fengið stóra og fullkomna bólu, á að bólusetjast aptur í

---

\*) Dieterichs segir, að flínkur bólusetjari, sem hefir skrífst fólt sér til hjálpar, gæti á þennann hátt bólusett 500 efl 1000 fiár á dag.

en þó skal hér vandlega aðgæta, því stundum kómur bólan ei út á þeim stað, hvar hún var sett, heldur nálægt honum.

Beri svo við, að hinn 4da dag eftir bólusetninguna finnist á fénu háar og fullar bólur, sem á hinum 6ta degi fyllast með greftri og minda skorpu, þá er það merki þess, að bólusetningin er ónýt, edur og að kindin hefir fengið bóluna áður henni var sett hún; sé það fyrri tilfellið, þá á kindin að bólusetjast að ný,

Skylði svo viðbera, að nálin af vangæßlu stingist of djúpt inn, edur og að ennur veikfi fylgi með, svo að þaraf kæmu illa örtud sár, þá er ei annað hèreið naudsýnlegra eða þarfara enn að þvo sárin með volgu vatni nokkrum sinnum daglega, og vilji þau ekki gróa af sjálfu sér, þá má leggja yfir þau léreptériu, sem sé vætt í Wallhumals seyði nokkrum sinnum daglega.

Þegar Fjárb. la gengur, þá ber þessa einum að gæta:

- 1) Ullin af þeim veiktu kindum gétur meðdeilt bóluna til annara heilbrygdra.
- 2) Heilbrygdt fé má ekki koma nálægt bólufé.
- 3) Fólki, er umgengst bólufé á að vera hreinlát og þvo sér vel og iduglega, því annars gétur það fengið útslátt og kláða af ullinni og þeim sjúku kindum.



## 10 Kapítuli.

### Um Hundaveiti.

#### § 1.

Hundarnir eru þorf stépnar, og reynslan hefir fénnt, að þegar hundafaraldur hefir gengid, há hefir fólk komist í vandræði með stépnur sínar, er þá seinlega ganga undan manningum. Á Íslandi eru þeir ei svo mörgum fvilum undirotnir, sem í öðrum löndum; eg vil því hér einungis gæta þeirra, sem þar eru stöðlegastir og algengastir.

#### § 2.

#### Þegar Hundar fá bein í hálsinn.

Það ber ei svo stjaldan við að hundar fá bein í hálsinn, er þeir ei gæta gleypst; þegar svo ber við, á strax að þreifa utantil á hálsinum, hvar beinið situr, edur og halda munni hundsins vel opnum, er þá opt hægt að taka það út með mjörri beygju-taung eda krók, gjörðum úr sterkum þrjóni. En sitji það lengra niður í vælindinu, á að hella í háls hundsins einum lýsispotti, og er, að því búnu, opt auðveldt að hta beininu niður með mjóum staut, sem sé tilbúinn úr stíði og vafinn með finum léreptærium á enum nedri enda. Hjálpi þetta ekki, þá skal gæfa hundinum upp-



solumedal 1 eda 2 gren af Uppsolu-vínsteini, upp-  
leystum í 6 matspónum af vatni; helming af þessu  
skal gefa hundinum fyrst, og fasti hann þá et strax  
upp, þá hinn helminginn eptir hálfann flúktíma.

## § 3.

## Um Sár og Bruna.

Ef hundar særast þarf ei annað enn sjá til að  
halda sárinu vel saman, og sé það á þeim stöðum  
hvar hundurinn ei gétur náð sjálfur til að fleikja sig,  
á það við og við að þvoft í keldu vatni, og fara  
að öðru, leiti að eins og áður er sagt um Sár á  
Hestum.

Bruna = sár læfnast best með Linolíu eda nýu  
og ósöltuðu smjóri, en þó er best að þvo þau áður  
í volgu vatni.

## § 4.

## Um Beinbrot.

Beinbrot læfnast best með því að setja beinend-  
ana laglega saman, vefjalíðan lérepi þarum og sauma  
það vel saman, þó binda um það með þræði eda  
mjóu bandi má efi; utanyfir þetta á nú að leggja  
2 spelfur gjerðar úr stídi eda gyrdívið, þær eiga að  
vera eins langar og fóturinn er, og bindast fast með  
léreptéstrímlum; ef hundurinn liggur nú fyrst, þá læfn-

ast beinbrotid af náttúrunni, þó er ómissandi að bada fótinn jafnadarlega með feldu vatni. Eðli þarf að smyrja neinni feiti eða smyrslum á beinbrotid, því það gjerir eðlert gagn, en opt verður að gæta að umbáðunum, að þær ei losni ofmjög, og ef svo viðber, verður að festa þær aptur. Hérum 8 daga eptir beinbrotid er gott að bada þau með Brennivini\*).

Á Dýralæknara-skólanum í Kaupmannahöfn eru beinbrotnir hundar. hafdir í smá-stíum útaf fyrir sig, og breiddt undir þá hey eða hálmur.

### § 5.

#### Um Gunda-saraldur.

Það hefir borid víð að svo mjög hefir orðid um hundasfaraldur, að mein. varð að í mörgum stæðum. Árid 1731 var svo mikill bráðdaudi á hundum og tóum á Íslandi, að þeir urdu víðutan og dóu að stuttum tíma lídnum. Tóurnar gengu heim að bæum og létu sig drepa\*\*). Seint á 18du öld var og mikill bráðdaudi á hundum um allt Norðurland og 1826 og 1827 bar lífa á henum á Sudur- og Vestur-landinu. Þeifi þessi sýnir sig með ýmsu móti, og er optast nær innifalin í bólgu (Tgjörð-

\*) Sjá J. F. E. Dieterichs Dyr-lægebog.

\*\*) Sjá Vice-logmanns E. Dlafssonar og Landphysisi B. Pálssonar ferðabók, Pag. 981.

arfótt) í hálsinum, heilanum eða lúgunum, hverri að er samfara Magnleysis = kölduveiki. Merki hennar eru þessi: hundar, sem áður hafa verið frískir, hætta að gæta jetid, verða mjög hæglátir, latir og sofa sífelðlega, hósta jafnadarlega og æla upp því sem þeir hafa jetid, augun fljóta í vatni, og flešja rennur úr nesum þeirra, snorkla þeir þá mjög af því, og eiga bágt með að draga andann. Í fyrstunni er alltid Koldusótt samfara Hunda = veikinni, en það er mikid undir því komid hvaða gáng sóttin tekur, og hverja parta líkamans hún leggst á. Stundum verður veikin að bólgu í heilanum (Hjerne = Betændelse) og hundurinn deyir í aði, fylgja henni þá optastnær sterkar sínategjur, og frodan rennur útúr heim, varir þá ei lengi áður þeir verða mátt- og tilfinningarlausir og detta dauðir nidur. Þeir, sem halda lífi eptir veikni þessa, eru í lúgann tíma mjög aumir og skjálfa allir á beinunum. Dýt kómur igjörð í lúgun, og eru þá optastnær samferða ádurtalin kénimerki veikinnar; síðurnar gánga ótt og titt upp og nidur; þar með fylgir einnig ákafur þurr hósti, óró og hardlífi, hundarnir fara úti skúmaftot og jeta ekkert, þó fyrir þá sé sett. Sé nú ei gífinn gaumur að þessu í tíma, verður úr því Vatnsýki og Kirnunar sótt, þurra-hósti, Búkhlaup og dauðinn sjálfur.

Strax sem úngir hundar verða raudeygðir, hætta að jeta og drekka, liggja úti skúmaftoti og eru afslíptalausir af ellu, þá er best að gefa þeim upp-

felumedal, sem um er gétid í § 2, samt setja þeim stólpípu með Ballhumals-seydi og nýu bræddu smjari eda lýsi. Dýralæknarar gefa þá og Alóespillur hvorn tíma þartil það á hundinu verkar; líka má þá sjá til að honum sé gefid þunnt að jeta, svo sem nýmjólk mifa eda annað þvilíft; sé hann mjög veiklulegur og stjálfi á beinunum, má hella ofaní hann tveimur matspónum af Ballhumals-seydi nokkrum sinnum daglega. Séu ádurtalin merki til Lúgnabólgu, þá á að gefa hundinum þessa saft: „Tað mulinn Saltpétur 1 lód, Glaubersalt 4 lód, dupt af Lætris-rót 3 lód, og svo mikid af Sirópi, sem þarf til að gjera saft úr þessu, og gef hundinum svomikid héraf, að þessu sé lokid á tveimur dögum, þó er þetta mikid komid undir aldri hans og stærð.“ Það er einka gott að setja þessum veiku hundum stólpípu, samt hánka þá framanábrjóstinu, og er það góðs viti þegar teluverð bólga kemur umhverfis hánkastadið.

Verdi hundum þýngra og þýngra um andardráttinu, og merkist mikid til hóstans, hvað litid sem hann gengur, þá er vatn í brjóstinu; og ei bata von.

Séu hundar mjög magnlausir og stjálfi á beinunum eda géti ei stáðid, þá á að gefa þeim Hvannarótar-brennivín, sem svari einni thesleid í senn, ásamt því fyrr umgétna Ballhumals-seydi; eðli heldur má gefa þessum stépnun annað að jeta enn léttmeti, sem þó er nærandi, svo sem nýmjólk eda mjelgrauta.

## § 6.

## Um Kláða.

Menn gera almennt greinarmun á þurra og vota kláða. Þurri kláði sýnir sig einfánlega á hofdi og hálsi, bógunum, og á þeim stöðum, hvar minnst er af hárunum; hvar kláðinn kemur undir, þar detta hárin af, og þar kemur ossa-kláði. Best er að þvo hundinum, sem hefir veifi þessa, uppúr volgu sápu-vatni iduglega, og bera svo á kláðann þessi smyrslí. „Lat Brennisteins-dupt 2 lóð, Lysis-sápu 3 lóð, og Terebintin = olíu 1 lóð“. — Hjálpi þetta ekki, verður að gefa búkhyreinsandi meðal og láta hann hálfsvelta undir kláðinn hverfur. Vota kláði kemur helst á hrygginn og ofantil á hálsinn, koma þar þá stórir hrúðurkollar með vatni og vilfu, og verður kláði sá mjög ljótur útlits; hundinn klæar þá mjög; nuggar hann sér uppvið, þartil blóðið rennur úr sárunum. Þessháttar kláði kemur mest á feita og lata hunda, hann er skadvænligur, og geta mannesstjur, ef ei er aðgáð, fengið hann af heim. Það er nauðsynlegt að gefa hundum lítið að jeta og jafnvel svelta þá vilji menn lækna veifi þessa; maka skal hundana með áður toldum smyrslum 5 eða sex daga í rennu, og hjálpi það ekki, þá skal þvo þeim í vatni, hvarí Kopar-viktril er uppleyst (nesnilega eitt quintin af Kopar-viktril uppleyst í hálfum pela af vatni), og ásamt því gefa Alés-píllur, sem um er

gétid í næst undangangandi §, þángadtil þær gjöra fullkomna verkun. Þessar semu pillur má og gefa hundum, efad þeir hafa Drmasýki, sem opt ber vid.


## § 7.

## Um Væði á Hundum.

Það er algengt í útlendum að hundar verða ódir í hundadegunum, en engin dæmi veit eg til að það hafi stéd á Íslandi; þó vil eg hér geta um kennimerki þessa óttalega sjúkdóms, því eg held það eigi ómegulegt, að hundarnir kynnu að geta fengið hann í megnum sólar-hita og þurka-sumrum á Íslandi einsog annarstadar, og eru einkenni hans þá þessi: All náttúra hundanna umbreytist, þeir jeta þá hluti, sem hundar annars ekki vilja sjá, til dæmis, ull, fatnað, léreptériur, flébætur og fleira, þeir geta naumlega kyngt, og það er líkast sem biti stæði í hálsi þeirra; þeir vilja gjarnan bita menn, og nedri flótturinn hángir nidur og fjapturinn stendur opinn; þeir nasa þaradauki uppi loptid, og umkring hmsa hluti; rófan hángir nidur á milli fótanna; þeir verða einsog blindir, reka sig á marga hluti og bita þarí; þeir óttast vatn og allt fljótandi. Afturhluti þeirra verður magnlaus, og lofsins deyja þeir í offalegu æði, og sinatengjum eda visna allir upp.

Vilefni til veikis þessarar er megn hiti, vatns-

ieysi, og hó einum, að Dietericks meiningu, ef þeir  
eigi fá að fullnægja ærlunarfsninni. Strax og  
vart verður við veiki þessa á að drepa þann óða  
hund, því annars er að óttast að hann bítí fólk, af  
hverju það sorglega leidir, að menn, sem bitnir  
verða af ódum hundi, fá þann hinn sama hryllilega  
sjúkdóm.



## B i d b æ t i r.

### 1.

Merki á lífsæðinni hjá hestum og fviðfénadi.

Í ýmislegum igjörðarsóttum er það eintum áridandi að gefa gaum að lífsæðar-slættinum, og er hin besta aðferð þartil: á hestum og nautpeningi skal leggja flatann lófann á rifbeinin vinstra megin, ei langt frá herdablabinu, er þar ætíð hægt að finna hjartsláttinn; en til þess að geta adgreint það náttúrlega lífsæðarlag frá hinu, er finna má í igjörðarsóttum, verður maður nákvæmlega að gefa gætur að hvorutveggjum, svo maður ei seinnameir villist afvega í lækningsarmátanum. Hjarta-slátturinn, sem varla merkist til hjá flépnunni, þegar hún er heilbrygd og í rölegu ásigkomulagi, verður í igjörðarsóttum audfundinn. Lífsæð hestsins slær optast nær ámillum 48 og 54 sinnum í mínútunni og stundum optar, þegar hann er heilbrygdur; hjá nautpeningi þarómóti slær lífsæðin hérumbil 38 til 46 sinnum á sama tímabili. Í igjörðarsóttum slær slagæðin þarómóti hjá hestum frá 70 til 100 sinnum í mínútunni, en hjá nautpeningi 60, 70 eða 80 sinnum í einu langann tíma. Þegar sóttin hardnar og veikleikinn vesnar, slær slagæðin hardara og smátt og smátt sljótara. Verði þarómót



lífæðar flögin minni, þá rénar sóttin, og veikta batn-  
ar, og má mikid af þessu ráða, hvað lengi fviðinn  
muni vara. Verði lífæðar flögin þarómóti ónátt-  
úrleg, eða þar komi millibil, hværi lífæðin eðli flær,  
þá er það optastnær dauda=merki.

## 2.

### Um Blóðtefur.

Það er víst skjaldgæst á Íslandi að nokkur mað-  
ur sé viðstaddur, sem gæti tekið flépnunum blóð, og þyki  
mér því hér vel til hlyða að fara nokkrum ordum um  
Blóðtefur.

Þýralæknarar velja optast nær hálssæðarnar til  
að taka blóð á; þessar æðar liggja beggja megin við  
barkann og vælindið framan og nedantil í hálfinum,  
og til þess að þær þrútni upp og verði audsjáanlegar,  
á að binda bandi nedantil um hálfinn, það er að  
flilja, nedantil við þann stad, er menn vilja taka flépn-  
unni blóð; band þetta á að binda að eins svo fast,  
að æð sú, er tafast skal blóð á, þrútni upp við, og  
hnitist það þvínæst með hnút og lyckju; er þá bezt,  
þegar þetta er gjort, að lypta hofdi flépnunnar nokk-  
ud uppá við; séu hárin á hálfinum laung og mikil,  
er bezt að væta þau með vatni, svo þau leggist vel  
nidur að flinninu; síðan setur maður odd blóðtefu-  
járnsins á æðina, sem nú er þrútin, svoléidis að egg-  
in á blóðtefu-járninu flóri hana lángetis; bezt er

svo að láta blæða í ílát, sem maður verður að vita hvað miðid tekur, og er þá hægt að sjá hvað miðid blæðt hefir; þegar blæðt hefir nú, svo nægja þyfir, og ávikið er við hmsa sjúkdóma hér að framan, á æðin að lykjaft, svo sképnunni blæði ei ofmiðid, hvað ed skédur á henna hátt: Taka á nokurnveginna sterkann tituprjón, og stínga honum þvert í gégnum báðar randir sárins, síðan sé loður tekinn af fari eda tagli gripisins og bundinn þvert um báða enda tituprjónsins, hvarvið gatid á æðinni nákvæmlega apturlykkt; vefja á hárunum optar enn einusinni um prjóninn, og hnyta vandlega, svo hnáturinn eðli gæti raknad. Noðrum dögum eptir blóðtekuna má taka tituprjóninn úr sárinu.

### 5.

Hvernig setja á baunir og hánka.

Baunir og hánkar gjöra sama gagn, en það er að visu minni þerf á að gæta um hvernig hánka skal þar flestir bændur bera vel fínbragd á aðferðina þar við, þó skal hér drepid á hvorutveggja.

Þegar setja skal Baunir (sem er eitthvørt hið ágætasta meðal í mörgum veifindum) á hesta, þá á fyrst að taka þykkt leður, skera af því frínglu, sem sé 3 þumlungar í þvermál, í miðjuna á frínglu þessa á að gjöra gat, sem sé hálfur annar þumlungur í þvermál, þarvið verður nefnd leður-fríngla álíka sem flat-

ur hringur; innri rind hringis þessa á að vera sívasin með her eða nidurtánum hampi, svo að lítið gat sé í gegnum hringinn; síðan býfir maður honum í Drebintin-olíu eða smyr hann með smjör, sé olían ekki fyrir hendi. Ef baunin á að setjast á bringu hestsins, þá á skinnid framáná bringunni að hverhrúðast, og hrúða þessi á síðan að skérast ofanfrá nidurávid, á þann hátt, að skurdurinn sé hálfur annar þumlungur á stærð; síðan á skinnid að burtflá allt að kjöfinu svomikid að baunirnar gæti legid þar,\*) að hverju búnu baunirnar leggjast í sárid; þegar þær hafa legid þar í 3 daga, þá á vogurinn, sem þar hefir fyrirhafnast, að út hreinsast, og sjálft sárid vandlega að þvost umhverfis á hverjum degi. Þegar lídnir eru 12 eða 14 dagar, mega baunirnar burttafást, og skylði þá viðbera að sárid hefði apturlykkt, á það að opnast að neðanverðu svo mikid, að baununum verði náð út og grofturinn verði vandlega afþvegin, líður þá ei á laungu áðurenn sárid grær af sjálfu sér. En hin sama er aðferdin, þá baun skal setja á boga, læri, síður eða aðra stadi.

Matpeningi skal baunir setja á þenna hátt: skurd, eins þumlungis stærð, á að gjöra í gegnum skinnid, ploða síðan með þumalsfingerinum skinnid frá kjöfinu nidurávid og til hliðanna, að holt verði undir skinnid; að því búnu smegjast baunirnar ofani þetta þannig tilbúna sár. Dýralæknarar brúka stundum í

\*) Menn brúka oftast á dýrum fleiri enn eina baun.

stad bauna hina svörtu Snerrarót (*Radix hellebori nigri*), skera af henni 5 eda 6 mjó og þumlúngslaung stykki, binda þau saman með finum þræði og leggja í sáríð. Ad öðru leiti á með sár þessi ad fara sem áður er sagt.

Til þess ad gæta hánkad hesta vel, er nauðsynlegt ad smida sér gæða hánkánál, hún gjörift á líka og stór reidinga-nál, hérumbil 6 þumlúnga á lengd, og 1 þumlúngur á breidd, framantil á hún ad vera tvíleggjud, og augad, hérumbil 1 þumlúngs langt, sé hversum á hinum aptari enda. Þar sem hánka skal setja hverhrúckar madur flinnid, og gjörir skurd í hrúckuna lángsetis, svo sáríð sé hérumbil 1 þumlúngur á lengd; 4 þumlúnga uedanverdt við hinn fyrsta skurd á ad gjöra annann á sama hátt og einn stóran, einúngis er adgætandi, ad skurdurinn eðli fari dýpra enn gégnum sjálfst flinnid; sidan á ad taka reim af flæði, lérepti eda finni einfléptu, eda hvad betra er, nockurnvegin breidt sockaband, sem sé þumlúngs breidt og hálfar alnar langt. Þetta á ad mafa í smjori eda lyfi og þræða igégnum hverauga hánkannálarinnar og stinga sidan nálinni þétt með flinninu frá heim efra skurdi til þess nedri; báðir endar hánkans eiga sidan ad bindast saman, svo hánkinn ei gæti útfallid. Ad 3 dögum lidnum á hánkinn ad færast, sem itrekast á hvorjum degi, eðli nú heldur forsómaft ad halda sárunum hreinum, þessvegna eiga þau ad þvost daglega. Eptir 12 eda 14 daga á hánkinn ad útdragast, og gróa sárin þá optast nær bráðum. Skyldi

svo viðbera, að bændur eða hánfinn þrútnadi svo mig af gresfrinum, að eigi yrði fluttur fram og aftur, þá er best að skipta um, og setja í stöðinn annann mjórri og þynnri hánka.

#### 4.

Hvernig blóðrás á að stöðvast.

Það eru einfanlega 2 meðel, með hverjum best er að stilla allsags blóðrás, og er það annaðhvort að binda fyrir æð þá er blæðir, eður og að lyfja henni með því að þrista á hana, en hverugt af þessu er bændum tilráðandi, að Rohlves meiningu, því fáir þeirra vita rétt með að fara\*); hann segir þarámóti að það besta meðal fyrir bændur að brúka se Gísis-sveppur (Lycoperdon borista), er almennt vex á túnunum og á eugjum, hann er í fyrstunni hvítur og harður, en síðan blautur, mólaitur og mjúkur á tefta.

Þegar nú sár blæða ákaflega, þá verður maður nákvæmlega að gá að hvar æðarnar eru sundurskornar eða særðar, í sárid á æðinni á nú að leggja litid stycki af Gísissvampi, en luckist manni ekki að finna sárid á æðinni, er best að fylla sárid með svampinum, og fer þá varla hjá því að nokkud komi í sárid á æð-

---

\*) Þó munu flestir bændur á Íslandi svo vel viti hornir og abgætnir, að þeir hafa tekið eptir því, að blóðrás opt stöðvast, þegar þrútt er á æðarnar.

inni. Beri svo við að sáríð sé á fótunum, hvar hægt er bindi um að leggja, þá á að leggja þverfingurs breiddt bindi ofaná svampinn, og á henna hátt festa Físiðsveppinn; verði því ei viðkomid, þá skal halda honum festum í sárinu með fingrunum, uns blóðrásin er stöðvud, og er þá best að láta Físiðsveppinn sitja þar fastann, uns vogurinn losar um hann, hvæðed skædur optastnær hinn 3ja dag, því ef madur reyndi til að plocca hann fyrir af, þá vill sáríð hfast upp að nýu, Hafi madur lagt bindi um sáríð, er best að losa það eftir 8 tíma, þæðed svampurinn þá optastnær situr fastur í sárinu.

### 3.

#### Um Lamba-géldingu.

Það er alvenja að gélda lamb með hnífi, sem allir vita, en það er ei heldur skjaldgæst að þau opt deya eftir géldinguna. Í útlandum hafa menn adra aðferð og sýnist hún öllu betri, þæðed lamb aldrei deya af géldingu, ef svo er aðfarid; en það skædur á hann hátt: Lambinu sé haldid svo það liggi á hrygginn, og þúngurinn hængi frítt; ullin umhverfis hann flippist þvínær af; að því búnu tekur madur tjargadann hampenda og hnyttir tveimur stuttum spítum við hvorn enda, þæptir gjörast 2 lyckjur á hampinn, á hann hátt, sem víðað er til á teblunni héraptan við, Fig. 3; lyckjur þessar leggjast umkring þúnginn og

hnýttast að svo fast sem verður, en spítturnar, sem hnýttar eru við báða enda hampfins, eru þartil ætlaðar, að maður með því meira abli gæti hnýtt hnúttinn; þegar þetta er gjört sleppir maður lambinu, en herdir á hnútinu kveld og morgna; á 4 eða 6 begi á þungurinn með báðum hölfum að flérfast af hertumbil einum humlúngi nedantil við hnútinu; sárid á þá að mafaft með nýu, óseltudu smjori, en á hnúttinn herdir maður daglega, unð hann dettur af af sjálfum sér; má þá smyrja sárid á ný með óseltudu smjori, svo mýbit og flugur ei setjist í það.

## Prentvillur.

- Bisp. 26 l. 16 badur l. s. badar.  
 — 30 l. 26 sárinum l. sárinu.  
 — 32 l. 1 § 18 l. § 19.  
 — 35 l. 5 þegar l. þegar.  
 — 58 l. 24 orðsafir l. orsafir.  
 — 74 l. 7 hattad l. háttad.  
 — 86 nedst da l. eða.  
 — 87 l. 16 barfannum l. barfanum.  
 — 96 l. 14 Narteticum l. Nartheticum.

## Útskiring yfir Töbluna.

Fig. 1 sýnir Búld, með 2ur oxum. Skeidin, sem axirnar lyftast í, er gjord af horni eða látáni.

Merkt: Þegar blóð á að taka, er öðruhverju bláinu upplofid, það sezt á ská á ædina, og með litlum hnall eða tréhamri flær madur á efri rend axarinnar, svo hún stingist á kaf.

- 2 sýnir Bólusetning á r-nál með skaptinu. Bláid þrúfast uppi skaptid og má á þann átt hafa fleiri enn eitt blá til sama skaptins; (sjá Þjárbólu hér að framan). No. 1 sýnir skaptid til að þrúfa nálina í. No. 2 sýnir nálina sjálfa.
- 3 sýnir Gélðingahnút, má hann brúka bæði til að losa vertur og gélða með, sem hér að framan er ávikid.
- 4 sýnir Hánkánál í tveimur portum; má þrúfa hana sundur og saman, svo hægra sé að hafa hana með á ferdum.
- 5 sýnir Bór til að stinga á vatnsþjúkum kindum með, a) er alurinn, b) er skeidin; (sjá Upphembu, bls. 69).
- 6 sýnir Stólpípu; hana má tilbúa sem fyrr er sagt.






*Fig. 6.*



*Fig. 3.*




*Fig. 2.*



*Fig. 1.*



*Fig. 4.*



*Fig. 5.*

